

Magnez B-Complex, VITTER BLUE, tabletki, 50 sztuk



Nasza cena: 4,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	DIAGNOSIS POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

Magnez B-Complex to suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych chcących uzupełnić dietę w składniki aktywne preparatu.

SKŁADNIKI

Węglan magnezu; substancja wypełniająca: sorbitol; substancja przeciwbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; niacyna; stabilizator: glikol polietylenowy; substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy; witamina B6; ryboflawina; tiamina; kwas foliowy; biotyna; witamina B12

Składniki	Zawartość w 1 tabletkie (%RWS*)
Magnez	125 mg (33,3%)
Niacyna (wit. B3)	16 mg (100%)
Witamina B6	1,4 mg (100%)
Ryboflawina (wit. B2)	1,4 mg (100%)
Tiamina (wit. B1)	1,1 mg (100%)
Kwas foliowy (wit. B9)	200 µg (100%)
Biotyna (wit. B7)	50 µg (100%)
Witamina B12	2,5 µg (100%)

*% Referencyjna Wartość Spożycia

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Magnez, niacyna oraz witaminy B6 i B12 wspomagają prawidłową pracę układu nerwowego, a wraz z kwasem foliowym przyczyniają się do utrzymania prawidłowych funkcji psychologicznych.

Biotyna i ryboflawina pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych, a wraz z tiaminą wspierają utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 1 tabletkę dziennie

OSTRZEŻENIA

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Kobiety w ciąży oraz matki karmiące przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

MASA NETTO

35,5 g

PRZECHOWYWANIE

Suplement diety powinien być przechowywany w suchym miejscu, w temperaturze 8°-25°, w zamkniętym opakowaniu.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Diagnosis S.A.

Gen. W. Andersa 38A

15-113 Białystok

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.