

Magnezin Comfort 60 tabletek



Nasza cena: 15,48 zł

Opis słownikowy

Rejestracja

Suplement diety

Opis produktu

Opis

Magnezin Comfort to suplement diety zawierający magnez (125 mg jonów magnezowych w jednej tabletkie). Magnez jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu (pomaga w prawidłowym działaniu mięśni, układu nerwowego, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia). Stosowanie suplementu diety Magnezin Comfort jest szczególnie zalecane w okresie zwiększonej podatności na stres, nasilonej pracy umysłowej i przy intensywnym wysiłku fizycznym.

Działanie:

Magnez:

- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
- przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
- pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
- pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,
- pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.

Zalecane spożycie:

Dorośli: 1-3 tabletki dziennie. Nie stosować na czczo. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia. Korzystny efekt można zaobserwować już w przypadku codziennego spożywania 1 tabletki suplementu diety Magnezin Comfort. Stosowanie 3 tabletek suplementu diety Magnezin Comfort na dobę zapewnia 100% zapotrzebowania na magnez.

Składniki - Magnezin Comfort 60 tabletek

węglan magnezu, substancje wypełniające (skrobia ziemniaczana, mannitol, sorbitol), substancje przeciwzbrylające (talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian), substancje wiążące (żelatyna, skrobia ziemniaczana), substancja rozsadzająca (karboksymetyloskrobia sodowa)

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.