

Maść na odciski 10 g

Nasza cena: 7,02 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	10 g
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM SALICYLICUM, ACIDUM LACTICUM

Opis produktu

Opis

Maść na odciski 10 g

Maść na odciski - preparat zawiera jako substancje czynne kwas salicylowy i plaster nostrykowy.

Dawkowanie - Maść na odciski 10 g

Do stosowania miejscowego.

Stopy namoczyć i osuszyć. Na odcisk nałożyć cienką warstwę maści i zakleić plastrem. Zabieg powtarza się przez kilkadziesiąt dni rano i na noc, nie zmywając smarowanych miejsc wodą. Wymoczyć stopy w gorącej wodzie, a następnie usunąć odcisk. Nie należy wycinać ani odrywać odcisków. W razie potrzeby powtórzyć kurację po 3 dniach.

Składniki - Maść na odciski 10 g

1g maści zawiera:

substancję czynną : 500 mg kwasu salicylowego,

substancje pomocnicze : plaster nostrykowy (ziele nostryka, olej rzepakowy, wosk żółty, kalafonia).

Działania

Lek Maść na odciski Gemi zawiera jako substancję czynną kwas salicylowy. Kwas salicylowy i substancja pomocnicza - plaster nostrykowy stosowany miejscowo na zrogowaciały naskórek działają złuszczeniowo, zmiękczeniowo i rozpuszczają zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie.

Wskazania - Maść na odciski 10 g

Usuwanie odcisków i nagniotków.

Przeciwwskazania - Maść na odciski 10 g

Nie należy stosować leku:

- w nadwrażliwości na kwas salicylowy, salicylany lub plaster nostrykowy,
- u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami układu krążenia,
- jeśli skóra w okolicy odciska (nagniotka) jest zraniona lub zmieniona zapalnie,
- na zmiany o dużej powierzchni,
- u dzieci.

Przeciwwskazania - Maść na odciski 10 g

Jak każdy lek, lek Maść na odciski Gemi może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić odczyny alergiczne i stan zapalny skóry. U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Uwagi

Należy przerwać leczenie jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. Maść należy nakładać wyłącznie na odcisk. Nie należy stosować leku na niezmienną zdrową skórę, ani na skórę uszkodzoną, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.