

Mastodynon, tabletki, 120 szt.

Nasza cena: 99,41 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*120
Postać	Tabletki
Producent	BIONORICA AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

Opis produktu

Opis

Mastodynon, tabletki jest homeopatycznym produktem leczniczym stosowanym wspomagająco w zespole napięcia przedmiesiączkowego.

Dawkowanie - Mastodynon, tabletki, 120 szt.

Dorośle kobiety: doustnie, 1 tabletka 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Preparat należy przyjmować przynajmniej 2-3 miesiące (także w trakcie krwawień miesięcznych). Poprawa następuje zwykle po 6 tygodniach.

Składniki - Mastodynon, tabletki, 120 szt.

1 tabletka zawiera: 162 mg Vitax agnus-castus TM, 81 mg Caulophyllum thalictroides D4, 81 mg Cyclamen purpurascens D4, 81 mg Strychnos ignatii D6, 162 mg Iris versicolor D2, 81 mg Lilium lancifolium D3.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian.

Działania

Niehormonalny preparat roślinny o działaniu dopaminergicznym. Wpływa regulująco na układ podwzgórze - przysadka mózgowa – jajniki, w tym zaburzenia wydzielania prolaktyny.

Wskazania - Mastodynon, tabletki, 120 szt.

Wspomagająco, w zespole napięcia przedmiesiączkowego z takimi objawami jak bolesność piersi - mastodynia, zaburzenia równowagi emocjonalnej, po wykluczeniu przez lekarza poważnych przyczyn dolegliwości.

Przeciwwskazania - Mastodynon, tabletki, 120 szt.

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nowotwory złośliwe sutków. U kobiet poniżej 18 roku życia.

Przeciwwskazania - Mastodynnon, tabletki, 120 szt.

Niezbyt często: ból głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, swędząca wysypka, trądzik, zwiększenie masy ciała.
Bardzo rzadko w trakcie stosowania preparatów zawierających Agnus castus może wystąpić przejściowe pobudzenie psychoruchowe, stany dezorientacji i omamy.

Uwagi

Ze względu na zawartość laktozy, tabletek nie powinny przyjmować pacjentki z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, nietolerancją galaktozy lub niedoborem laktazy (typu Lappa). Ze względu na brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci, nie podawać pacjentkom w wieku poniżej 18 lat.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.