

Melisana, płyn, 155 ml



Nasza cena: 19,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	155ml
Producent	Klosterfrau M.c.m.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Dawkowanie - Melisana, płyn, 155 ml

Stosowanie doustne:

Tradycyjnie stosuje się zazwyczaj: 1 do 3 łyżeczek preparatu rozcieńczone co najmniej podwójną ilością wody lub innego płynu, względnie bez rozcieńczania podane na kostkę cukru.

Stosowanie zewnętrzne:

Należy wcierać preparat w bolące miejsca. Przy stosowaniu na wrażliwe partie skóry lub też użycie w formie okładu, lek można rozcieńczyć dwoma częściami wody.

Składniki - Melisana, płyn, 155 ml

100 ml zawiera olejki eteryczne wydestylowane z alkoholem z 4,04 g mieszanki: liści melisy 10,48%, kłączy omanu 13,96%, korzenia arcydzięgla 134,96%, kłączy imbiru 13,96%, kwiatów goździka 5,57%, kłączy galangi 5,57% owoców pieprzu czarnego 1,39%, korzenia goryczki 13,69%, owocni pomarańczy 13,96%, kory cynamonowca 6,28%, kwiatów strączyńca 0,7%, owoców kardamonu 0,2%, 100 ml zawiera 62 mg olejków lotnych z wymienionych surowców w 66,8% (V/V) etanolu

Wskazania - Melisana, płyn, 155 ml

Preparat stosowany wewnątrznie pomocniczo w dolegliwościach nerwicowych, stanach napięcia fizycznego i psychicznego, zaburzeniach snu, a także w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych na tle nerwowym, wzdęciach, braku apetytu. Zewnętrznie używany jest w bólach nerwowych, w bólach mięśniowych, w zapaleniu dziąseł.

Przeciwwskazania - Melisana, płyn, 155 ml

Nie stosować w chorobie wrzodowej żołądka i jelit. Lek zawiera 66% objętościowych alkoholu etylowego. Stosując lek wg. zaleconego dawkowania pacjent przyjmuje w każdym 3 łyżeczkach do 7,8 g alkoholu.

Preparat nie powinien być stosowany u:

- dzieci
- pacjentów cierpiących na schorzenia wątroby
- kobiet ciężarnych i karmiących piersią
- osób z chorobą alkoholową
- osób po urazach mózgu
- pacjentów cierpiących na padaczkę

Przeciwwskazania - Melisana, płyn, 155 ml

Preparat może zaburzyć bezpieczne prowadzenie pojazdów mechanicznych. Ze względu na zawartość alkoholu etylowego działanie leków przyjmowanych równolegle może być nasilone lub upośledzone.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.