

Mensil Max, 50 mg, 4 tabletki



Nasza cena: 30,18 zł

Opis słownikowy

Dawka	50 MG
Opakowanie	*4
Postać	TABL.DO ROZGR.I ZUCIA
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SILDENAFILUM

Opis produktu

Opis

Mensil Max, 50 mg, 4 tabletki

Mensil Max przeznaczony jest dla mężczyzn powyżej 18 roku życia z zaburzeniami erekcji. Wspomagają uzyskanie i utrzymanie erekcji, przez 5 godzin od zażycia preparatu.

Skład

Substancją? czynną? leku jest syldenafil. Jedna tabletkę leku zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu). Pozostałe skł?adniki (substancje pomocnicze) to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Zastosowanie

MENSIL MAX zawiera substancję czynną – sildenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prężeniu, zwiększając napływ krwi do prężenia podczas podniecenia seksualnego. Sildenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Lek MENSIL MAX jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prężenia wystarczającej do odbycia stosunku prężeniowego.

Kiedy nie stosować leku MENSIL MAX:

Jeżeli pacjent ma uczulenie na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Jeżeli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje jakiegokolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy bolesnej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Jeżeli pacjent przyjmuje riociguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia

pućnego (tj. wysokiego ciśnienia w pucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak MENSIL MAX, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.

W przypadku ciężkich chorób serca lub wtroby.
Po niedawno przeżytym udarze lub zawale serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (tzw. r

etinitis pigmentosa).

Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (tzw. NAION).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku MENSIL MAX należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku:

- Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zmniejszenie prężności lub choroba Peyroniego.
- Dolegliwość ze strony serca: W tym przypadku lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
- Choroby wrzodowej lub przy zaburzeniach krzepnięcia krwi (takich jak hemofilia).
- Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku MENSIL MAX i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku MENSIL MAX nie należy stosować jednocześnie z innymi

doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburze? wzrodu.
Leku MENSIL MAX nie nale?y stosowa? jednocze?nie z terapiami
t?tniczego nadci?nienia p?ucnego (TNP) z zastosowaniem
syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.

Leku MENSIL MAX nie nale?y przyjmowa?, je?li nie stwierdzono
zaburze? erekcji. **MENSIL MAX nie jest lekiem przeznaczonym
dla kobiet.**

Specjalne uwagi dotycz?ce pacjentów z zaburzeniami czynno?ci
nerek lub w?troby
Pacjenci z zaburzeniami czynno?ci nerek lub w?troby powinni
poinformowa? o tym lekarza. Pacjenci z zaburzeniami czynno?ci
nerek lub w?troby nie powinni stosowa? dawki syldenafilu
wy?szej ni? 25 mg.

Dzieci i m?odzie?

Leku MENSIL MAX nie nale?y stosowa? u osób w wieku poni?ej 18
lat.

MENSIL MAX a inne leki

Nale?y powiedzie? lekarzowi lub farmaceutyce o wszystkich
lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a tak?e o
lekach, które pacjent planuje stosowa?
MENSIL MAX mo?e wykazywa? interakcje z niektórymi lekami,
zw?aszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W
przypadku pogorszenia stanu zdrowia wymagaj?cego
natychmiastowej pomocy medycznej, nale?y poinformowa?
lekarza, farmaceut? lub piel?gniark? o za?yciu leku MENSIL MAX
oraz o godzinie jego za?ycia. Nie nale?y przyjmowa? leku MENSIL
MAX jednocze?nie z innymi

lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku MENSIL MAX, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Należy zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku MENSIL MAX, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować

niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Jeśli pacjent już przyjmuje riociguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV, zaleca się

rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki (25 mg) leku.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty, może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania.

Objawy takie występują u niektórych pacjentów przyjmujących lek MENSIL MAX i leki alfa-adrenolityczne. Ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku MENSIL MAX. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku MENSIL MAX. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki (25 mg) leku.

W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów

głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, napięcie mięśni brzucha, krzyżowanie nóg. Należy unikać szybkiego wstawania lub siadania.

Jeśli pacjent przyjmuje ketokonazol, erytromycynę, cymetydynę, przed przyjęciem leku MENSIL MAX powinien skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań nie

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.