

## Metafen, tabletki, 10 szt.

Nasza cena: 9,78 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM, PARACETAMOLUM

### Opis produktu

#### Opis

Metafen jest lekiem w postaci tabletek do podawania doustnego.

Zawiera dwie substancje czynne- ibuprofen, który należy do leków - niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i wykazuje obwodowe działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz dodatkowo przeciwzapalne oraz paracetamol o ośrodkowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

#### Dawkowanie - Metafen, tabletki, 10 szt.

Lek przeznaczony do stosowania doustnego. Zalecane jest następujące dawkowanie:

Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki.

W razie konieczności dawkę powtarzać do trzech razy na dobę.

Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę. W razie konieczności dawkę można powtarzać do trzech razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 tabletki na dobę.

#### Składniki - Metafen, tabletki, 10 szt.

Każda tabletkę zawiera:

Substancje czynne: ibuprofen 200 mg, paracetamol 325 mg.

Substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian.

#### Wskazania - Metafen, tabletki, 10 szt.

- bóle głowy wywołane zapaleniem zatok przynosowych
- bóle zębów
- bóle pourazowe
- bóle miesiączkowe

- bóle po zabiegach chirurgicznych

### Przeciwwskazania - Metafen, tabletki, 10 szt.

Nie należy stosować leku Metafen:

- jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku
- w ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby
- w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy; perforacji lub krwawień
- w ciężkiej niewydolności serca
- w okresie ciąży i karmienia piersią
- w czasie jednoczesnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych oraz w skazie krwotocznej
- w przypadku zatrzymania moczu
- w czasie jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2
- u pacjentów u których występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6 fosforanowej
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat
- w przypadku choroby alkoholowej

### Przeciwwskazania - Metafen, tabletki, 10 szt.

Niezbyt często ( 1 na 100osób):

- niestrawność, ból brzucha, nudności,
- bóle głowy,
- pokrzywka i świąd,
- wymioty i biegunka.

Rzadko (1 na 1000osób):

- biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
- zawroty głowy, szumy uszne, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia,
- pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Bardzo rzadko (1 na 10000osób):

- zaburzenia wskaźników morfologii krwi,
- powiększenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby,
- rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno- rozplywna naskórka,
- wrzodzące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroba Crohna, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, smołowate stolce, krwawe wymioty szczególnie u osób w wieku powyżej 65lat,
- u osób nadwrażliwych mogą wystąpić ciężkie reakcje uczuleniowe, jak: obrzęk twarzy, języka krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli,
- u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi podczas leczeniem ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja.

### Uwagi

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**