

Metazydyna 20 mg 60 tabletek

Nasza cena: 26,68 zł

Opis słownikowy

Dawka	20MG
Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	POLFA PABIANICE POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TRIMETAZIDINUM

Opis produktu

Opis

Metazydyna 20 mg 60 tabletek

Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania przez pacjentów w celu leczenia objawowego pacjentów ze stabilną dławicą piersiową.

Dawkowanie:

Zaleca się stosowanie 1 tabletki zawierającej 20 mg trimetazydyny 3 razy dobowo, zazwyczaj podczas posiłków.

Wszelkie inne informacje na temat stosowania leków zostały zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego.

Działanie:

- chroni komórki, zwłaszcza mięśnia serca i wątroby przed niekorzystnymi następstwami niedokrwienia,
- zapobiega rozwojowi wewnątrzkomórkowej kwasicy metabolicznej,
- działa ochronnie na mitochondria,
- zmniejsza wytwarzanie wolnych rodników,
- wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe,

- wywiera korzystny wpływ na integralność błon komórkowych.

Skład:

1 tabletkę zawiera 20 mg trimetazydyny dichlorowodoru.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- choroba Parkinsona,
- objawy parkinsonizmu,
- drżenia, zespół niespokojnych nóg,
- ciężkie zaburzenie czynności nerek.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku często może dochodzić do działań niepożądanych.

Najczęściej objawiają się poprzez:

- zawroty głowy,
- ból głowy,
- ból brzucha,
- biegunka,
- niestrawność,
- nudności,
- wymioty,
- wysypka,
- świąd,
- pokrzywka,
- astenia.

Wszelkie niezbędne informacje zostały zawarte w ulotce. Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do stosowania leku powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.