

# Metformax 500, 500 mg 30 tabletek

Nasza cena: 4,52 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,5 G
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	METFORMINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

#### Zaleca się stosowanie leku w:

- leczeniu cukrzycy typu 2,
- leczeniu monoterapii,
- skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną,
- nieprawidłowej tolerancji glukozy (stanie przedcukrzycowym),
- leczeniu zespołu policystycznych jajników (ang. PCOS).

### Dawkowanie:

#### W monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi:

- 500 mg chlorowodoru metforminy - 1 tabletkę 2 – 3 razy na dobę w czasie lub po posiłku. Maksymalna zalecana dawka chlorowodoru metforminy wynosi 3 g na dobę.

#### W skojarzeniu z insuliną:

Chlorowodorek metforminy i insulina mogą być stosowane jednocześnie w celu uzyskania lepszej kontroli stężenia glukozy we krwi.

- 500 mg - 1 tabletkę 2-3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny ustala się na podstawie wyników badania stężenia glukozy we krwi.

## **Działanie:**

Metformina jest biguanidem o działaniu przeciwhiperglykemicznym, zmniejszającym zarówno podstawowe i poposiłkowe stężenie glukozy we krwi. Preparat nie pobudza wydzielania insuliny i dlatego nie powoduje hipoglikemii.

## **Skład:**

1 tabletkę zawiera w swoim składzie 500 mg, metforminy chlorowodoru. 1 tabletkę o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg chlorowodoru metforminy, co odpowiada 390 mg metforminy.

## **Przeciwwskazania:**

**Nie zaleca się stosowania leku jeżeli u pacjentów występują któreś z poniższych dolegliwości:**

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, cukrzycowa kwasica ketonowa,
- cukrzycowy stan przedśpiączkowy,
- niewydolność lub zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny
- odwodnienie,
- ciężkie zakażenie,
- wstrząs,
- niewydolność serca,
- niewydolność oddechowa,
- niedawno przebyty zawał serca,
- niewydolność wątroby,
- ostre zatrucie alkoholem,
- alkoholizm.

## **Działania niepożądane:**

**Podczas stosowania leku zwłaszcza w początkowej fazie leczenia mogą występować takie działania niepożądane jak:**

- nudności,
- wymioty,
- biegunka,
- ból brzucha
- utrata apetytu
- zaburzenia smaku

- zaburzenia żołądka

W celu zapoznania się ze szczegółowymi działaniami niepożądanymi występującymi podczas stosowania leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub też skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.