

# Molsidomina WZF 2 mg 30 tabletek

Nasza cena: 18,31 zł

## Opis słownikowy

Dawka	2MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	MOLSIDOMINUM

## Opis produktu

### Opis

## Wskazania - Molsidomina WZF 2 mg 30 tabletek

Lek jest zalecany do stosowania podczas :

- zapobieganie i leczenie objawów dławicy piersiowej
- niewydolność wieńcowa
- poprawa tolerancji wysiłku u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

## Dawkowanie - Molsidomina WZF 2 mg 30 tabletek

Lek stosuje się zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego dostosowując dawkę w zależności od stopnia nasilenia choroby oraz jego rytmu aktywności.

Preparat można przyjmować przed posiłkami, w czasie posiłków lub po posiłkach. .Jeśli występuje konieczność zwiększenia dawki leku, należy zwiększać ją stopniowo aby uniknąć u niektórych pacjentów uporczywych bólów głowy.

Zalecana dawka: 1-2 mg 3-4x/dobę (3-8 mg molsydminy/dobę). W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 4 mg 3-4x/dobę (12-16 mg molsydminy/dobę).

## Działanie

Preparat zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen, zwiększa tolerancję wysiłku.

Molsydolina jest pochodną sydnoniminy, zmniejsza napięcie mięśni gładkich naczyń. Rozkurcz mięśni gładkich powoduje zwiększenie pojemności żył pozawłośniczkowych, przez co zwiększa się pojemność łożyska żylnego i zmniejsza powrót żylny, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia napełniania obu komór. To z kolei zmniejsza pracę serca i poprawia warunki hemodynamiczne w krążeniu wieńcowym. Rozszerzenie naczyń tętniczych powoduje zmniejszenie oporu obwodowego, prowadzące do bezpośredniego zmniejszenia pracy serca i ciśnienia wewnątrzkomorowego ze spadkiem zapotrzebowania tlenowego serca. Znosi ponadto skurcz tętnic wieńcowych

i rozszerza duże gałęzie tych tętnic.

## Skład

1 tabletkę zawiera 2 mg molsydominy

## Przeciwwskazania - Molsidomina WZF 2 mg 30 tabletek

Nadwrażliwość na molsydominę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku. Wstrząs. Znaczny stopień niedociśnienia tętniczego. Ciąża, szczególnie I trymestr. Okres karmienia piersią. Jednoczesne stosowanie syldenafile i molsydominy jest przeciwwskazane.

## Działania niepożądane

Podczas stosowania leku mogą pojawić się działania niepożądane: zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy (występujące na początku leczenia i zwykle przemijające w trakcie jego trwania), zawroty głowy. Zaburzenia naczyniowe: obniżenie ciśnienia tętniczego. Zaburzenia żołądka i jelit: nudności. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zaczerwienienie twarzy. Zaburzenia naczyniowe: obniżenie ciśnienia tętniczego. Zaburzenia żołądka i jelit: nudności. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zaczerwienienie twarzy, wysypki skórne.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.