

Morwa Biała Forte + Berberyna, 60 tabletek

Nasza cena: 31,96 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	COLFARM S.A. POLSKA
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

Morwa Biała forte + Berberyna to suplement diety zawierający wyciąg z morwy białej i berberys. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

SKŁADNIKI

wyciąg z morwy białej, substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z korzenia berberysu, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca: sorbitole; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe, guma arabska, karagen.

Składnik Zawartość w 1 tabletkie

Wyciąg z morwy białej 600 mg

Otrzymane z suszonej morwy białej

Wyciąg 103

iąg z mg
korz
enia 100
berb mg
erys
uStan
dary
zow
any
na z
awa
rtoś
ć ch
loro
wod
orku
berb
eryn
y

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Wyciąg z liści morwy białej przyczynia się do utrzymania równowagi metabolizmu węglowodanów w organizmie, wspomaga prawidłową produkcję insuliny oraz korzystnie wpływa na rozkład polisacharydów.

Berberys wspomaga zdrowie wątroby, pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu oraz wspiera zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

MASA NETTO

55 g

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 1 tabletkę 1 raz dziennie

OSTRZEŻENIA

Nie stosować **u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.**

U osób stosujących terapię insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące stosować po konsultacji z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.