

Muconasin, spray do nosa, 30 ml



Nasza cena: 27,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Postać	SPRAY DO NOSA
Producent	Pharma Line S.r.l., Włochy
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

OPIS

MUCONASIN to **wyrób medyczny** w postaci sprayu zawierający 6% roztwór *N-acetylocysteiny* oraz 3% hipertoniczny roztwór chlorku sodu.

Nie zawiera konserwantów.

SKŁAD

1 butelka o pojemności 30 ml zawiera: *N-acetylocysteinę* 1,8 g, chlorek sodu 0,9 g.
Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, wersenian sodu, woda oczyszczona.

POSTAĆ PRODUKTU

Spray do nosa

DZIAŁANIE

Działanie sprayu polega na upłynnieniu wydzieliny z nosa i udrażniania nosa i zatok.

Działanie wyrobu opiera się na fizycznych i mechanicznych właściwościach jego dwóch składników:

- Buforowany **hipertoniczny roztwór chlorku sodu**: hipertoniczne roztwory soli podawane bezpośrednio na błony śluzowe dróg oddechowych transportują wodę na zasadzie osmozy. Zwiększa to procentową zawartość wody w śluzie wyścielającym nabłonek, rozrzedzając go, a tym samym ułatwiając jego usuwanie.
- **N-acetylocysteina**: acetylowana pochodna aminokwasu cysteiny, wywiera działanie mukolityczne poprzez bezpośredni kontakt ze śluzem. Działanie to zachodzi dzięki obecności w cząsteczce grup sulfhydrylowych, zdolnych do rozrywania wiązań dwusiarczkowych mukoprotein nadających śluzowi lepkość, powodując jego depolimeryzację.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Spray do nosa Muconasin wskazany jest do stosowania w celu upłynnienia i ułatwienia mechanicznego usunięcia wydzieliny śluzowej lub śluzowo - ropnej zalegającej w jamie nosowej (ostry, podostry i wolno ustępujący nieżyt nosa, przewlekły i śluzowo - skrzepowy nieżyt nosa, naczynio - ruchowy nieżyt nosa) oraz wewnątrz zatok przynosowych (ostre i przewlekłe zapalenie zatok), łagodząc objawy i

przebieg ostrych, podostrych i przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

SPOSÓB UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO

1. Zdjąć nasadkę ochronną.
2. Dobrze wstrząsnąć preparatem.
3. Odchylić głowę do tyłu.
4. Delikatnie wsunąć aplikator w otwór nosowy.
5. Nacisnąć dwoma palcami podstawę aplikatora i rozpylić 2-3 razy.
6. Powtórzyć czynności w drugim nozdrzu.
7. Oczyszczyć aplikator i założyć nasadkę ochronną .

2-3 rozpylenia do każdego otworu nosowego, od dwóch do trzech razy dziennie.

Nie stosować dłużej niż 10 dni.

Kurację tę można powtarzać kilkakrotnie w ciągu roku, przerywając stosowanie preparatu na co najmniej 1 tydzień pomiędzy cyklami.

OSTRZEŻENIA

Spray do nosa po rozpyleniu ma zapach siarki, który nie wpływa na właściwości preparatu. Po każdym użyciu sprayu należy przemyć aplikator.

Po użyciu zaleca się ponowne założenie nasadki ochronnej.

Nie stosować w przypadku indywidualnej nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników produktu.

Długotrwałe stosowanie produktów miejscowych może prowadzić do nadwrażliwości: jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie używać wyrobu medycznego po upływie terminu ważności.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Nie połykać.

Nie rozpylać do oczu.

Używanie tej samej butelki przez więcej niż jedną osobę może ułatwić przenoszenie infekcji.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Wytwórca:

Pharma Line S.r.l.

Via Bertani 2

20154 Mediolan

Włochy

Dystrybutor:

Solinea Sp. z o.o.

Elizówka

ul. Szafranowa 6

21-003 Ciecierzyn

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.