

Mucopect Control, 375 mg kapsułki twarde, 30 sztuk



Nasza cena: 23,03 zł

Opis słownikowy

Dawka	375MG
Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	ADAMED PHARMA S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CARBOCISTEINUM

Opis produktu

Opis

Mucopect Control, 375 mg kapsułki twarde, 30 sztuk

Mucopect Control stosowany jest w objawowym leczeniu chorób układu oddechowego przebiegających z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

Działanie

Mucopect Control, 375 mg, kapsułki, twarde zawiera substancję czynną zwaną karbocysteina. Należy ona do grupy leków zwanych „mukolitykami”. Jej działanie polega na zmniejszeniu lepkości śluzu (flegmy). Dzięki temu wydzielina śluzowa jest łatwiejsza do odkrztuszenia.

Skład

Substancją czynną leku jest karbocysteina.

1 kapsułka twarda zawiera 375 mg karbocysteiny.

Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana i magnezu stearynian. Otoczka kapsułki: tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172) i żelatyna.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przyjmuje się doustnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Mucopect Control jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

Zwykle dawka początkowa wynosi dwie kapsułki przyjmowane trzy razy na dobę.

Jeśli nasilenie objawów zmniejszy się, dawkę należy zmniejszyć do jednej kapsułki przyjmowanej cztery razy na dobę.

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni. W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.

Nie należy stosować leku przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem

Ważne

Kiedy nie przyjmować leku Mucopect Control:

Jeśli pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Objawy uczulenia to: wysypka, trudności z przełykaniem lub oddychaniem, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.

Jeśli pacjent ma wrzody w żołądku lub w jelicie.

Producent

Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie, ul. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów,

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.