

Mucosolvan, syrop, 0,03g/5ml, 200 ml



Nasza cena: 35,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,03 G/5ML
Opakowanie	200 ml
Postać	SYROP
Producent	OPELLA HEALTHCARE POLAND SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	AMBROXOLUM

Opis produktu

Opis

Mucosolvan, syrop, 0,03g/5ml, 200 ml

Preparat ułatwiający odkrztuszanie i łagodzący kaszel.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat. - 10 ml (2 łyżeczki do herbaty) 2 razy na dobę,
dzieci:

6-12 lat - 5 ml 2-3 razy na dobę;

2-6 lat - 2,5 ml 3 razy na dobę;

1-2 lat - 2,5 ml 2 razy na dobę.

Syrop przyjmować po posiłku.

Skład

5ml syropu zawiera: chlorowodorek ambroksolu 30mg

substancje pomocnicze: sorbitol 70%, glicerol 85%, kwas benzoesowy, acesulfam K, aromat truskawkowy, aromat waniliowy.

Działanie

Mukolityk ułatwiający odkrztuszanie. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, stymuluje wytwarzanie surfaktantu płucnego i poprawia czynność rzęsek nabłonka układu oddechowego. W efekcie zwiększa się ilość śluzu i poprawia jego transport, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel. Wchłanianie jest szybkie i niemal całkowite.

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ambroksol lub pozostałe składniki preparatu. Preparat w postaci syropu, w największej rekomendowanej dawce dobowej (20 ml), zawiera 5 g sorbitolu. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować syropu. Preparat w postaci tabletek zawiera laktozę i jest przeciwwskazany u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Możliwe działania niepożądane

Często: biegunka.

Niezbyt często: nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, reakcje nadwrażliwości.

Rzadko: zgaga.

Częstość nieznana: niestrawność, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna (łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym).

Uwagi

Należy zachować ostrożność podczas stosowania w ciąży. Zwłaszcza w I trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania ambroksolu. Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania ambroksolu u kobiet karmiących piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.