

Mufluil Forte 10 ampułek a 2ml do inhalacji

Nasza cena: 32,08 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	AMP.
Producent	Solinea
Rejestracja	Inne

Opis produktu

Opis

Mufluil Forte 10 ampułek a 2ml do inhalacji

Mufluil Forte to sterylny roztwór do nebulizacji zawierający N-acetylocysteinę i kwas hialuronowy, przeznaczony do ochrony przed infekcjami i zaczerwienieniem śluzówki nosa, jamy ustnej i gardła. N-acetylocysteina zmniejsza lepkość śluzu, nawilża śluzówkę i przynosi ulgę w objawach związanych z reakcjami zapalnymi, takich jak trudność w przełykaniu, uczucie ciała obcego w gardle, łaskotanie lub suchość. Kwas hialuronowy przylega do powierzchni błony śluzowej zatrzymując fizjologicznie obecną wodę, tworzy film ochronny, przynosząc ulgę podrażnionej śluzówce. Bariera ta pomaga zachować integralność błony śluzowej i chroni przed działaniem czynników zewnętrznych oraz patogenów.

Skład

Jedna ampułka zawiera: siarczanowa woda termalna ze Źródeł Bellsio, N-acetylocysteinę (20 mg), sól sodowa kwasu hialuronowego, olejek eteryczny tymiankowy, sól dwusodowa kwasu wersenowego, Polisorbit 20, diwodorofosforan sodu dwuwodny, wodorofosforan sodu siedmiowodny, wodorotlenek sodu, woda

Zastosowanie

Mufluil Forte jest sterylnym roztworem do nebulizacji, wskazanym do stosowania w przypadku ostrych lub przewlekłych schorzeń układu oddechowego takich jak:

- zapalenie migdałków,
- gardła, krtani,
- nieżyt nosa,
- zapalenie tchawicy i oskrzeli,
- zapalenie oskrzeli
- kaszlu różnego pochodzenia,
- objawów przeziębienia lub grypy,

- zapalenia strun głosowych,
- zaczerwienienia gardła,
- chrypki,
- problemów z oddychaniem w przebiegu choroby refluksowej przełyku,
- w rekonwalescencji po zabiegach laryngologicznych.

Dawkowanie

Zaleca się rozpylanie 1-2 ampułek dziennie zgodnie z zaleceniami lekarza. Trzymać szklaną ampułkę mocno jedną ręką, a do drugiej wziąć papierową chusteczkę, następnie ująć wierzchołek ampułki wzdłuż białej linii lub w białym punkcie łamania, wyrwać wystarczający nacik i przełamać ampułkę. Zawartość ampułki wlać do odpowiedniego pojemnika dozownika aerozolu i rozpylić zgodnie z instrukcją jego użycia. Upewnić się, że ciecz nie jest rozpylana do oczu.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: zawartość jednej ampułki preparatu 2 razy dziennie. Dzieci w wieku 2-6 lat: połowa zawartości ampułki 2 razy dziennie.

Pojemnik zawiera podziałkę wskazującą połowę dawki.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki preparatu.

Roztwór należy podawać za pomocą urządzeń przeznaczonych do aerozoloterapii (inhalatorów tłokowych; preparat nieodpowiedni do urządzeń ultradźwiękowych).

Sposób podania

Przed i po użyciu wyrobu należy dokładnie umyć ręce. Aby prawidłowo podać preparat, należy:

- Zgiąć i oderwać ampułkę od paska, z którym jest połączona;
- Delikatnie wstrząsnąć ampułką przed użyciem;
- Otworzyć ampułkę przekręcając zamknięcie;
- Naciskając ściany ampułki z umiarkowaną siłą, wlać wskazaną ilość roztworu do zbiornika nebulizatora, a następnie dodać roztwór soli fizjologicznej w stosunku 1:1. Produkt należy aplikować donosowo (używając maski lub końcówki donosowej) za pomocą urządzenia przeznaczonego do aerozoloterapii;
- W przypadku zastosowania połowy dawki, pojemnik można zamknąć przez odwrócenie i wciśnięcie zatyczki. Zamknięta w ten sposób ampułka powinna być przechowywana w temperaturze pokojowej, a jej zawartość zużyta w ciągu 24 godzin od pierwszego otwarcia.
Produkt może być stosowany o każdej porze dnia bez żadnych szczególnych ograniczeń w tym zakresie. Czas leczenia zależy od charakteru i nasilenia objawów, ale nie powinien przekraczać 30 dni. Jeśli objawy nie ustąpią po upływie określonego czasu, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej dwóch lat.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie ma wystarczających dowodów na to, że produkt może być bezpiecznie przyjmowany przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią, dlatego przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Dla bezpieczeństwa pacjenta nie należy przyjmować N-acetylocysteiny z innymi lekami, a w szczególności z następującymi preparatami:

- leki przeciwkaszlowe: powodując zmniejszenie odruchu kaszlu, mogą przyczyniać się do nadmiernego nagromadzenia wydzieliny w oskrzelach;
- leki, które zatrzymują lub ograniczają ilość śluzu w oskrzelach (cholinolityki): ich działanie może być przeciwne do działania N-acetylocysteiny;

Skutki uboczne

Długotrwałe przyjmowanie produktów do stosowania miejscowego może prowadzić do występowania reakcji uczuleniowych. W takich przypadkach należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza w celu ustalenia właściwej terapii. Jeśli u pacjenta wystąpiły działania

niepożądane, które zostały lub nie zostały opisane w ulotce, należy to zgłosić lekarzowi lub farmaceucie. Stosowanie N-acetylocysteiny może powodować działania niepożądane takie jak: reakcje alergiczne, skurcz oskrzeli, wodnisty wyciek z nosa, obturacja oskrzeli, zapalenie jamy ustnej, wymioty, mdłości, pokrzywka, wysypka i świąd. W bardzo rzadkich przypadkach odnotowano poważne wykwity skórne (zespół Lyella lub Stevens-Johnsona). W większości przypadków do wystąpienia wspomnianych reakcji skórnych przyczynił się inny lek. Jeśli pacjent zauważy u siebie takie wykwity, powinien od razu przerwać stosowanie N-acetylocysteiny i zasięgnąć porady lekarza. Niektóre badania wskazują na możliwość zmniejszenia fizjologicznej agregacji płytek krwi na skutek przyjmowania N-acetylocysteiny.

Ostrzeżenia

Unikać kontaktu z oczami.

Obecność siarkowego zapachu jest charakterystyczna dla jednego ze składników preparatu i nie świadczy o zmianie jego właściwości.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności lub gdy opakowanie jest naruszone lub uszkodzone.

Ze względu na reakcje N-acetylocysteiny z niektórymi materiałami (gumą, żelazem, miedzią), zaleca się stosowanie akcesoriów do inhalacji ze szkła lub plastiku. Gumowe lub metalowe elementy urządzenia do inhalacji

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny

Solinea Sp. z o.o. Sp. K

Elizówka 65, Hala I

21-003 Ciecierzyn