

Multibiotic maść, 10 saszetek po 1g

Nasza cena: 10,26 zł



Opis słownikowy

Dawka	1G
Opakowanie	*10 sasz.
Postać	MASC
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY RZESZÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	NEOMYCINUM, BACITRACINUM, POLYMYXINUM B

Opis produktu

Opis

Multibiotic to preparat złożony zawierający antybiotyki (bacytracynę, neomycynę i polimyksynę B) stosowany miejscowo na skórę w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Skład i działanie:

Jest to preparat złożony zawierający 3 substancje czynne, wszystkie o działaniu przeciwbakteryjnym, lecz o różnych, wzajemnie uzupełniających się, mechanizmach działania. Bacyt racyna i polimyksyna B to antybiotyki polipeptydowe o działaniu bakteriobójczym, stosowane wyłącznie miejscowo. Powodują uszkodzenie ściany i błony komórkowej bakterii. Neomycyna to antybiotyk z grupy aminoglikozydów. Mechanizm działania neomycyny, wspólny dla całej grupy aminoglikozydów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Skojarzone działanie 3 antybiotyków zapewnia szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego preparatu i zmniejsza ryzyko pojawienia się szczepów opornych. Neomycyna stosowana miejscowo na nieuszkodzoną skórę praktycznie nie wchłania się do krwi, jednakże w przypadku uszkodzeń skóry, stosowania długotrwałego lub na dużym obszarze może wykazywać działanie ogólnoustrojowe. Polimyksyna B i bacytracyna nie wchłaniają się z powierzchni skóry.

Wskazanie:

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu:

- pierwotnych i wtórnych zakażeń skóry (np. zakażone niewielkie rany, zakażenia skóry w oparzeniach i odmrożeniach) wywołane przez bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce) oraz pałeczki Gram-ujemne (w tym z rodzaju Pseudomonas), oraz w zapobieganiu zakażeniom wtórnym drobnych ran ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń.

Przeciwwskazanie:

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na polimyksyny.

Preparatu nie należy stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, zmiany sączące, na głębokie rany kłute, ciężkie oparzenia, na błony śluzowe ani do oczu.

Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia (ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego).

Nie stosować u kobiet w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie:

Preparat **Multibiotic** ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Wielkość dawki zależy od wielkości i umiejscowienia zmian chorobowych. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia:

Po umyciu (mydłem i wodą) i osuszeniu skóry należy nakładać na nią niewielką ilość maści 2-5 razy na dobę, zachowując równe odstępy czasowe. Nie stosować dłużej niż przez 7 dni. W razie potrzeby stosować z gazowym opatrunkiem ochronnym.

Nie stosować preparatu u dzieci poniżej 12. roku życia ze względu na ryzyko toksycznego działania preparatu (ryzyko uszkodzenia nerek i słuchu).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.