

Multigastro krople na trawienie, 30 ml

Nasza cena: 15,49 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Producent	NP PHARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Krople na trawienie Multigastro zawierają składniki wspierające:

- prawidłowe trawienie
- czynność wątroby
- pasaż jelitowy
- eliminację nadmiaru gazów i uczucia pełności

Krople na trawienie zawierają:

- ekstrakt z kwiatu rumianku
- ekstrakt z owoców kopru włoskiego
- ekstrakt z liści karczocha
- ekstrakt z korzenia czarnej rzepy
- ekstrakt z owoców gorzkiej pomarańczy
- olejek z mięty pieprzowej

Krople na trawienie wspierają:

- prawidłowe trawienie
- czynność wątroby
- pasaż jelitowy
- eliminację nadmiaru gazów i uczucie pełności

Rumianek pomaga w ucisku w obrębie żołądka, wzdęciach i odbijaniu. Pomaga w niestrawności oraz wspomaga prawidłowy metabolizm lipidów.

Owoce kopru włoskiego wspierają zdrowy układ pokarmowy oraz prawidłowe trawienie.

Karczoch wspiera trawienie i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego i pasażu jelitowego. Wspomaga pracę wątroby i pomaga w przepływie soków trawiennych. Przyczynia się również do prawidłowego poziomu lipidów we krwi.

Gorzka pomarańcza wspiera metabolizm tłuszczów. Owoce kopru wspierają zdrowy układ pokarmowy.

Mięta pieprzowa wspiera prawidłowe funkcje trawienne i zdrowie żołądka, pomaga we wzdęciach.

W preparacie znajduje się również ekstrakt z korzenia czarnej rzepy.

Sposób użycia;

3 x dziennie po 15 kropli. Krople rozpuścić w niewielkiej ilości wody i wypić albo dodać do łyżeczki cukru i popić wodą. Przyjmować przed lub po posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.