

Myconafine 1%



Nasza cena: 18,63 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15g
Postać	KREM
Producent	AXXON POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TERBINAFINUM

Opis produktu

OpisLek Myconafine 1% ma postać kremu, zawiera substancję czynną terbinafiny chlorowodorek. Lek ten ma właściwości przeciwgrzybiczne, działa na różnorodne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry.

Dawkowanie - Myconafine 1%

Przed użyciem leku, należy umyć i osuszyć ręce i chorobowo zmienione miejsce. następnie niewielką ilość kremu nanieść na zmienione chorobowo miejsca na skórze i lekko wetrzeć krem.

W przypadku stosowania leku na fałdach skórnych, miejsca te można przykryć świeżą i czystą gażą, zwłaszcza używając kremu nocą.

- Grzybica stóp: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.
Grzybica fałdów skórnych: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.
Grzybica tułowia: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.
Drożdżycza skóry: zwykle raz na dobę przez 1 tydzień.
Łupież pstry: zwykle raz na dobę przez 2 tygodnie.

Składniki - Myconafine 1%

1 g kremu zawiera: substancję czynną: chlorowodorek terbinafiny 10 mg; substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbata 60, izopropylu myrystynian, sodu wodorotlenek, wodę oczyszczoną.

Działania

Działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów.

Wskazania - Myconafine 1%

Myconafine 1% krem jest wskazany w miejscowym leczeniu:

- grzybicy stóp
- grzybicy fałdów skórnych
- grzybicy tułowia
- drożdżycy skóry

- łupieżu pstrego.

Przeciwwskazania - Myconafine 1%

Nie należy stosować kremu w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania - Myconafine 1%

Sporadycznie występuje zaczerwienienie skóry, świąd lub pieczenie w miejscach pokrytych kremem (rzadko wymaga przerwania stosowania leczenia).

Objawy alergiczne takie jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka (należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.