

## Mycospor, 1%, krem 15 g



Nasza cena: 59,09 zł

### Opis słownikowy

Dawka	1%
Opakowanie	15 g
Postać	KREM
Producent	BAYER AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BIFONAZOLUM

### Opis produktu

#### Opis

Preparat przeciwgrzybiczny o szerokim zakresie działania do stosowania na skórę.

#### Dawkowanie - Mycospor, 1%, krem 15 g

Lek zwykle stosuje się raz na dobę, najlepiej wieczorem, przed położeniem się do łóżka. Na chorobowo zmienione miejsca na skórze należy nanieść ciekłą warstwę leku i wetrzeć. Do pokrycia powierzchni skóry wielkości dłoni wystarczy niewielka ilość kremu.

Czas trwania leczenia:

Aby nastąpiło całkowite wyleczenie zakażenia zaleca się stosowanie leku:

- w grzybicy stóp, grzybicy między palcami stóp 3 tygodnie
- w grzybicy tułowia, grzybicy rąk i w fałdach skórnych od 2 do 3 tygodni
- w łupieżu pstrym, w łupieżu rumieniowatym 2 tygodnie
- powierzchniowej kandydozie skóry od 2 do 4 tygodni

Stosowanie u dzieci:

U małych dzieci lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

#### Składniki - Mycospor, 1%, krem 15 g

1g kremu zawiera 10 mg bifonazolu. Substancje pomocnicze: alkohol benzylowy, alkohol cetylostearylowy, palmitynian cetylowy, polisorbat 60, oktylododekanol, woda oczyszczona, monostearynian sorbitanu.

#### Działania

Lek zawiera substancję czynną bifonazol o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego.

### Wskazania - Mycospor, 1%, krem 15 g

Lek jest wskazany w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, takich jak grzybica rąk i nóg, grzybica tułowia, grzybica ładów skórnych, łupież pstry, grzybnice powierzchniowe skóry, łupież rumieniowaty.

### Przeciwwskazania - Mycospor, 1%, krem 15 g

- nadwrażliwość na bifonazol, alkohol cetylostearylowy lub którąkolwiek substancje pomocniczą
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na inne związki pochodne imidazolu (klotrymazol, ekonazol, mikonazol).
- na błony śluzowe i uszkodzoną skórę.

### Przeciwwskazania - Mycospor, 1%, krem 15 g

Niezbyt często:

ból, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, świąd, wysypka z pęcherzykami i pęcherzami, suchość skóry, podrażnienie skóry.

Rzadko:

reakcje alergiczne związane z nadwrażliwością na którykolwiek składnik leku.

### Uwagi

Unikać kontaktu z oczami

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**