

Mycosyst 100 mg 7 kapsułek

Nasza cena: 10,92 zł

Opis słownikowy

Dawka	100MG
Opakowanie	*7
Postać	KAPS.
Producent	POLFA GRODZISK MAZOWIECKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	FLUCONAZOLUM

Opis produktu

Opis

Mycosyst jest to produkt leczniczy wskazany w leczeniu zakażeń grzybiczych.

Wskazania:

- kryptokokowego zapalenia opon mózgowych
- kokcydiodomykozy
- inwazyjnych kandydoz
- drożdżakowych zakażeń błon śluzowych, w tym: zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych
- przewlekłego zanikowego drożdżakowego zapalenia jamy ustnej (związanego ze stosowaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające
- drożdżycy pochwy, ostrej lub nawracającej, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające
- drożdżakowego zapalenia żołądki, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające
- grzybicy skóry, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupieżu pstrego, zakażeń drożdżakowych skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego
- grzybicy paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie.

Dawkowanie:

Dawkę ustala lekarz indywidualnie. Dawka dobrana jest w zależności do rodzaju i ciężkości zakażenia grzybiczego. Jeżeli w danym zakażeniu konieczne jest stosowanie dawek wielokrotnych, leczenie należy kontynuować do chwili ustąpienia objawów klinicznych i mikrobiologicznych zakażenia. Niedostatecznie długi okres leczenia może być przyczyną nawrotu czynnego zakażenia.

Skład:

Jedna kapsułka zawiera 100 mg flukonazolu (Fluconazolum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza bezwodna (99 mg).

Substancje pomocnicze:

- Laktoza bezwodna
- Skrobia kukurydziana
- Krzemionka koloidalna bezwodna
- Magnezu stearynian
- Talk
- Powidon (K30)

Kapsułka

- Indygotyna (E 132)
- Tytanu dwutlenek (E 171)
- Żelatyna

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane:

Wszystkie działania niepożądane związane z leczeniem Mycosyst 100 mg zawarte są w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.