

# Myditin 3 mg, 20 tabletek

Nasza cena: 24,97 zł

## Opis słownikowy

Dawka	3 MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	SUN-FARM POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	PRIDINOLUM

## Opis produktu

### Opis

## Myditin, 3 mg, 20 tabletek - Pridinolum

### Informacje podstawowe

Myditin jest lekiem zmniejszającym napięcie mięśniowe. Jest to wynik działania poprzez ośrodkowy układ nerwowy.

Myditin stosuje się w leczeniu napięcia skurczowego mięśni u dorosłych (skurcze mięśni pochodzenia ośrodkowego i obwodowego):

- bólu krzyża (lumbago),
- skurczu mięśni szyi (kręczu szyi),
- ogólnego bólu mięśni.

### Skład

Substancją czynną jest **prydynol**.

Jedna tabletkę zawiera 3,02 mg prydynolu (w postaci 4 mg prydynolu mezylanu).

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, olej rycynowy uwodorniony, talk, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Myditin to białe, okrągłe tabletki z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Lek Myditin jest dostępny w opakowaniach zawierających 20 tabletek.

### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub

farmaceuty.

#### Zalecana dawka:

½ do 1 tabletki (1,5 – 3 mg prydynolu) 3 razy na dobę.

#### Stosowanie u dzieci i młodzieży

Brak dostępnych danych na temat stosowania leku u dzieci i młodzieży.

#### Sposób podawania

Lek należy przyjmować doustnie.

Tabletki należy przyjmować bez żucia, popijając odpowiednią ilością płynu (najlepiej 1 szklanką wody [200 ml]).

Lek należy przyjmować niezależnie od posiłków; przy czym działanie jest szybsze, gdy jest on przyjęty przed posiłkiem.

Pacjenci z niskim ciśnieniem krwi powinni przyjmować tabletki po posiłkach, aby zmniejszyć ryzyko omdlenia.

#### Czas trwania leczenia

Leczenie może być długotrwałe. Lekarz zdecydował, przez jaki czas należy przyjmować lek.

#### Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana należy zwrócić się do lekarza. Lekarz zdecyduje, jakie będzie dalsze postępowanie.

Możliwe, że działania niepożądane wymienione w punkcie 4 mogą mieć cięższy przebieg.

#### Pominięcie przyjęcia leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z opisem dawkowania w niniejszej ulotce.

#### Przerwanie przyjmowania leku

Może nastąpić nawrót pierwotnych objawów. W takim przypadku należy poinformować lekarza. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## Przeciwwskazania do stosowania

- jeśli pacjent ma uczulenie na prydynol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z poniższych chorób:
  - jaskra,
  - łagodne powiększenie gruczołu krokowego (rozrost gruczołu krokowego),
  - zaburzenia opróżniania pęcherza (zatrzymanie moczu),
  - mechaniczne zwężenie w przewodzie pokarmowym,
  - nieregularne bicie serca (arytmia),
  - w pierwszych 3 miesiącach ciąży.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:

- Jeśli pacjent ma choroby wątroby lub nerek.
- U tych pacjentów substancja czynna może być obecna w organizmie w większym stężeniu i (lub) przez dłuższy czas niż zwykle.
- U pacjentów w wieku 65 lat lub starszych.
- Jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi, ponieważ ryzyko wystąpienia zaburzeń krążenia (omdlenia) może być zwiększone.

## Lek Myditin zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

## Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,

które pacjent planuje przyjmować.

Myditin wzmacnia działanie produktów leczniczych z grupy zwanej lekami przeciwocholinergicznymi. Dotyczy to na przykład niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśności pęcherza, nietrzymania moczu, w leczeniu astmy lub w chorobie Parkinsona. Patrz także punkt 4. „Możliwe działania niepożądane”.

## Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W pierwszych 3 miesiącach ciąży nie wolno przyjmować leku Myditin. W kolejnych miesiącach ciąży lek Myditin można stosować wyłącznie po dokładnej ocenie przez lekarza, pod nadzorem lekarza i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Ponadto przez cały okres karmienia piersią lek Myditin można przyjmować tylko wtedy, jeśli został on przepisany przez lekarza.

## Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Możliwym działaniem niepożądanym leku Myditin mogą być tymczasowe zaburzenia widzenia. W przypadku problemów z widzeniem nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych niebezpiecznych czynności.

## Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania zaleconych dawek działania niepożądane występują rzadko lub niezbyt często i zwykle ustępują po zmniejszeniu dawki lub po odstawieniu leku.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane, szczególnie podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków (leków przeciwocholinergicznymi):

- suchość w ustach, pragnienie, przemijające zaburzenia widzenia (rozszerzenie źrenic, zaburzenia koncentracji, wrażliwość na światło, nieznaczny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego), zaczerwienienie i suchość skóry, zmiany rytmu serca (wolne bicie serca, a następnie przyspieszone bicie serca), zaburzenia oddawania moczu, zaparcia i bardzo rzadko, wymioty, zawroty głowy oraz niestabilny chód.

## Niezbyt często występujące skutki uboczne przyjmowania leku

- przyspieszone bicie serca (tachykardia), reakcje ze strony układu krążenia, niskie ciśnienie krwi,
- nudności, ból brzucha, suchość w ustach,
- zmęczenie i uczucie osłabienia (astenia)
- zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia mowy,
- niepokój.

## Rzadko występujące skutki uboczne przyjmowania leku

- zaburzona zdolność skupienia wzroku,
- biegunka, wymioty,
- reakcje nadwrażliwości, takie jak swędzenie, zaczerwienienie skóry, obrzęk lub duszność,
- zaburzenia uwagi, koordynacji, smaku,
- lęk, depresja.

## Częstość nieznana

- nieregularne bicie serca,
- przełom jaskrowo-rzęskowy w jaskrze z zamkniętym kątem przesączania,
- przegrzanie,
- osłabienie mięśni,
- drżenie rąk, dolegliwości skóry (np. mrowienie, pieczenie, drętwienie),

- halucynacje,
- trudności w oddawaniu moczu

## Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

## Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o.  
ul. Dolna 21  
05-092 Łomianki  
Wytwórca

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.