

Mydocalm 50 mg 30 tabletek

Nasza cena: 13,69 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,05G
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	GEDEON RICHTER LTD. WĘGRY [HU]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TOLPERISONUM

Opis produktu

Opis

Mydocalm 50 mg, 30 tabletek

Wskazania

Leczenie objawowe u pacjentów dorosłych spastyczności poudarowej.

Dawkowanie

Zalecana średnia doustna dawka dobową to 150-450 mg, w trzech dawkach podzielonych, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i tolerancją pacjenta oraz zaleceniami lekarza.

Działanie

Tolperyzon to lek zwiotczający mięśnie działający ośrodkowo, ale dokładny mechanizm działania tolperyzonu nie jest w pełni poznany. Najważniejszym działaniem tolperyzonu jest jego hamujące działanie na czynność odruchową rdzenia kręgowego, które to działanie wraz z hamującym działaniem na drogi zstępujące rdzenia kręgowego może być głównym działaniem przypisywanym leczniczej przydatności tolperyzonu.

Skład Mydocalm 50 mg

1 tabletkę powlekana zawiera 50 mg tolperyzonu chlorowodoru.

Przeciwwskazania

- nadwrażliwość na substancję czynną (tolperyzon) lub na podobny pod względem budowy chemicznej eperyzon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- miastenia;
- laktacja;
- ciąża, szczególnie w I trymestrze.

Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa stosowania tabletek zawierających tolperyzon jest poparty danymi uzyskanymi od ponad 12 000 pacjentów.

Najczęściej wymienia się działania niepożądane:

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej,
- zaburzenia ogólne,
- zaburzenia neurologiczne
- zaburzenia żołądka i jelit.

Większość przypadków ma charakter łagodnych i samoistnie ustępujących schorzeń. Szczegółowa

informacja odnośnie działań niepożądanych w ulotce dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.