

Mykodermina, maść 50 g



Nasza cena: 16,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50g
Postać	MASC
Producent	PAMPA PIASECZNO POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM UNDECYLENICUM

Opis produktu

Opis

Lek Mykodermina jest preparatem przeciwgrzybiczym.

Dawkowanie - Mykodermina, maść 50 g

Lek należy stosować na umytą i starannie osuszoną skórę, jeśli lekarz nie przepisze inaczej, miejsca dotknięte grzybicą lub zagrożone należy smarować 1 lub 2 razy na dobę. Po ustąpieniu objawów zakażenia należy kontynuować leczenie preparatem co najmniej przez 4 tygodnie

Tylko do użytku zewnętrznego. Nie należy stosować na otwarte rany i na błony śluzowe

Składniki - Mykodermina, maść 50 g

1 g maści zawiera substancję czynną monoetanolamid kwasu undecylenowego 60 mg.

Inne składniki: wazelina biała, lanolina, parafina ciekła, wazocelan (wazelina biała, lanolina, cholesterol, parafina stała).

Działania

Grzybice powierzchniowe są zakażeniami występującymi w zewnętrznych warstwach skóry, w paznokciach, włosach oraz błonach śluzowych. Wywoływane są zwykle przez grzyby z rodzaju Trichophyton, Microsporium i Epidermophyton, a także grzyby drożdżakopodobne. Substancją czynną leku jest monoetanolamid kwasu undecylenowego, który działa grzybobójczo, a gdy jest zastosowany w dużych stężeniach działa grzybobójczo. Lek działa na grzybnię i zarodniki.

Wskazania - Mykodermina, maść 50 g

Lek Mykodermina stosuje się w leczeniu:

- grzybicy drobnozarodnikowej skóry gładkiej i owłosionej
- grzybicy stóp
- grzybicy naskórkowej, egzemy mycoticum
- wspomagającym grzybic skóry i szpar międzypalcowych, grzybic paznokci, drożdżycach i profilaktycznie.

Przeciwwskazania - Mykodermina, maść 50 g

Nie należy stosować leku jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwości) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Nie stosować na otwarte rany i na błony śluzowe.

Przeciwwskazania - Mykodermina, maść 50 g

U pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników leku może wystąpić przemijające miejscowe podrażnienie skóry.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.