

## Naklofen Top, 1%, żel 60 g



Nasza cena: 13,90 zł

### Opis słownikowy

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dawka       | 10MG/1G                    |
| Opakowanie  | 60 g                       |
| Postać      | ZEL                        |
| Producent   | Krka Pharm.d.d. Novo Mesto |
| Rejestracja | Lek bez recepty            |

### Opis produktu

#### Opis

**Naklofen Top** jest to preparat do stosowania miejscowego zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

#### Skład i działanie:

Substancją czynną preparatu jest diklofenak, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu fenyllooctowego. Wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Diklofenak przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie diklofenaku polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Diklofenak zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura ciała, ból, sztywność stawów). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Preparat jest stosowany miejscowo w leczeniu stanów zapalnych związanych z chorobami reumatycznymi lub urazami. Po zastosowaniu miejscowym diklofenak przenika przez skórę do tkanek podskórnych, ścięgien, mięśni, tkanek okołostawowych, ma zdolność kumulacji w mazi stawowej. Wchłanianie diklofenaku zależy od zastosowanej dawki, wielkości leczonego obszaru, czasu kontaktu preparatu ze skórą i od właściwości powierzchni na którą jest stosowany. Ponadto, dzięki zastosowaniu odpowiedniego podłoża preparat ma także działanie łagodzące i chłodzące.

#### Wskazania:

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu:

- reumatyzmu pozastawowego (ból mięśni, stany zapalne tkanki łącznej, kaletki maziowych, zapalenie ścięgien, zapalenie pochewek ścięgien, ból stawu barkowego lub lędźwiowego odcinka kręgosłupa)

- zmian pourazowych: naciągnięcia, skręcenia, zwichnięcia

-ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów.

Dawkowanie:

Preparat ma postać żelu do stosowania miejscowego na skórę. Wielkość dawki zależy od wielkości powierzchni, na którą stosowany jest żel. Po każdym zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Na powierzchnię skóry należy nałożyć cienką warstwę żelu i delikatnie wcierać. Stosować 3–4 razy na dobę. Zależnie od wielkości powierzchni stosować 2–4 g preparatu (tj. ilość żelu odpowiadającą odpowiednio objętości wiśni lub objętości orzecha włoskiego).

Jeżeli po 7 dniach stosowania preparatu objawy nie ustępują lub nasilają się należy skonsultować się z lekarzem. Bez konsultacji z lekarzem preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 14 dni (lub 21 dni w przypadku bólu związanego z zapaleniem stawów).

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**