

Naproxen Hasco, 1,2%, żel, 50 g

Nasza cena: 8,38 zł



Opis słownikowy

Dawka	1,2%
Opakowanie	50 g
Postać	ZEL
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	NAPROXENUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany miejscowo - jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w bólach mięśniowych i bólach stawów, np. w chorobie zwyrodnieniowej stawów, urazach tkanek miękkich, urazach i stanach pourazowych stawów, ścięgien, pochewek ścięgniastych.

Dawkowanie - Naproxen Hasco, 1,2%, żel, 50 g

Do stosowania na skórę.

Lek należy nakładać 4 do 5 razy na dobę na bolące miejsce i delikatnie wsmarowywać. Na powierzchnię skóry ok 7 cm na 7 cm stosuje się pasek żelu o długości 1 cm.

Składniki - Naproxen Hasco, 1,2%, żel, 50 g

(1g żelu):

Substancja czynna: naproksen sodowy 12 mg,

substancje pomocnicze: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, lewomentol, chloralu wodzian, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Działania

Lewomentol wywołuje na skórze uczucie chłodu i działa miejscowo znieczulająco, powoduje miejscowe rozszerzenie naczyń krwionośnych i ułatwia przenikanie naproksenu do zmienionych chorobowo tkanek. Wofdzian chloralu dzięki właściwościom lekko drażniącym powoduje korzystne odruchowe rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Wskazania - Naproxen Hasco, 1,2%, żel, 50 g

Lek stosuje się przeciwbólowo i przeciwzapalnie w bólach mięśni i stawów:

- w chorobie zwyrodnienia stawów.
- w urazach tkanek miękkich,
- w urazach stawów i ścięgien.

Przeciwwskazania - Naproxen Hasco, 1,2%, żel, 50 g

- uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - naproksen lub którykolwiek ze składników leku,
- nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy)
- trzeci trymestr ciąży
- dzieci do lat 3.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.