

NARANYL spray, 50 ml



Nasza cena: 22,72 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 ml
Producent	NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

NARANYL spray, 50 ml

NARANYL spray to wyrób medyczny w postaci sprayu o działaniu antybakteryjnym i antyseptycznym.

Wskazania

- wspomaga leczenie uszkodzeń skóry hamując niewielkie krwawienia, dezynfekując i zapobiegając zakażeniom
- pielęgnuje podrażnioną skórę i zmniejsza odczuwanie bólu poprzez delikatne schłodzenie i nawilżenie zranionego miejsca
- przyspiesza gojenie tworząc na powierzchni skóry ochronny film zapobiegający negatywnemu działaniu czynników zewnętrznych.

Skład

Woda, gliceryna, karboksymetylochitozan, hialuronian sodu, srebro.

Właściwości

NARANYL spray zawiera chitozan – innowacyjny składnik o szerokim spektrum działania.

Chitozan to organiczny związek chemiczny z grupy polisacharydów. Powstaje w wyniku deacetylacji chityny. Chitozan tworzy na powierzchni skóry warstwę ochronną, która zapobiega wnikaniu drobnoustrojów – chroniąc przed zakażeniem. Stymuluje proces regeneracji skóry i zapewnia skuteczną absorpcję wysięku jednocześnie hamując krwawienie.

Kwas hialuronowy występuje powszechnie w wielu tkankach ciała. Pełni rolę podpory strukturalnej, zapewniając napięcie, odżywienie i

elastyczność tkanek. Kwas hialuronowy wspomaga i przyspiesza proces regeneracji naskórka, powodując szybsze gojenie.

Srebro koloidalne wzmacnia silne właściwości antybakteryjne i antyseptyczne.

Wyrób medyczny NARANYL spray zawiera również gliceryne, która nawilża i osłania naskórek.

NARANYL spray nie szczypie, chłodzi ranę i zmniejsza odczuwanie bólu.

Sposób użycia i dawkowanie

Przed każdym użyciem wstrząsnąć kilkakrotnie buteleczkę. Przed pierwszym użyciem kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem. Aplikator skierować w kierunku uszkodzonej skóry i spryskać w zależności od potrzeby. Aplikować z odległości ok. 10 cm. Można także nawilżyć preparatem wacik i przecierać zranione, uszkodzone miejsce.

Stosować 2-3 razy dziennie po 2-4 dawki w zależności od potrzeb.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub odczucia, że działanie wyrobu medycznego jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Stosować maksymalnie do 7 dni.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować wyrobu medycznego NARANYL spray:

- w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu,
- w przypadku otwartych, sączących się ran,
- u dzieci poniżej 3. roku życia,
- do innych otworów ciała, np. oka, nosa.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W razie kontaktu z oczami obficie przemyć wodą. Kobiety w ciąży przed zastosowaniem wyrobu powinny zasięgnąć porady lekarza. U dzieci stosować pod nadzorem osoby dorosłej.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.