

Naraya Plus 28 tabletek

Nasza cena: 35,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	EXELTIS SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ETHINYLESTRADIOLUM, DROSPIRENONUM

Opis produktu

Opis

Naraya Plus, 28 tabletek

Wskazania:

Produkt zalecany jest do stosowania jako antykoncepcja doustna.

Dawkowanie:

Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza bądź też zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.

Działanie:

- hamowanie owulacji
- zmiany w obrębie endometrium.
- antyandrogenne

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 3 mg drospirenonu i 0,02 mg etynyloestradiolu.

Przeciwwskazania:

- aktualna lub przebyta zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna);

- aktualna lub przebyta zakrzepica tętnicza (np. zawał mięśnia sercowego)
- choroby sprzyjające wystąpieniu zakrzepicy
- aktualny lub przebyty incydent naczyniowo-mózgowy;
- cukrzyca ze zmianami naczyniowymi,
- ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- ciężka dyslipoproteinemia;
- wrodzone lub nabyte predyspozycje do zakrzepicy tętnicznej lub żylniej,
- aktualne lub przebyte zapalenie trzustki,
- ciężka lub ostra niewydolność nerek;
- aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby;
- podejrzenie obecności lub obecność nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych
- krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii;
- występowanie w przeszłości migreny z ogniskowymi objawami neurologicznymi;
- nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane mogące występować podczas stosowania doustnej antykoncepcji:

Często występujące:

- chwiejność emocjonalna,
- bóle głowy,
- ból brzucha,
- trądzik,
- ból i powiększenie piersi,
- bolesne miesiączkowanie,
- krwawienie nie związane z cyklem miesiączkowym,
- zwiększenie masy ciała.

Ciężkie działania niepożądane:

- żyłne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe,
- tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe,
- nadciśnienie tętnicze,

- nowotwory wątroby.

Jeżeli u pacjenta wystąpią którekolwiek z działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Należy zauważyć, że działania niepożądane mogą występować jedynie u części pacjentem, mogą one również przebiegać w różny sposób i mieć różny poziom nasilenia.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.