

# Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, 15 ml



Nasza cena: 28,22 zł

## Opis słownikowy

|                   |   |
|-------------------|---|
| Opakowanie        | 15 ml   |
| Postać            | AER.  |
| Producent         | PROCTER & GAMBLE HEALTH POLAND S.A. POLSKA [PL] |
| Rejestracja       | Lek bez recepty                                 |
| Substancja czynna | OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM                    |

## Opis produktu

### Opis

## Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus 0,5 mg/ml, aerozol do nosa

Aerozol do nosa stosowany w objawowym leczeniu niedrożności nosa.

### Działanie

Substancja czynna leku - oksymetazolin powoduje zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.

### Wskazania

Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus jest wskazany do objawowego leczenia niedrożności nosa.

### Składniki

0,5 mg/ml oksymetazoliny chlorowodoru.

1 dawka aerozolu (50 µl) zawiera około 25 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodoru.

Substancje pomocnicze: Sorbitol (E 420), Sodu cytrynian (do wyrównania pH) (E 331), Polisorbit 80, Alkohol benzylowy, Kwas cytrynowy bezwodny (do wyrównania pH) (E 330), Suchy wyciąg z aloesu, Benzalkoniowy chlorek, roztwór, Lewomentol, Acesulfam potasowy (E 950), Cyneol, L-Karwon, Disodu edetynian, Woda oczyszczona

## Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia: 1 - 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego do 2 - 3 razy w ciągu doby.

Dzieci w wieku 6 - 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do 2 - 3 razy w ciągu doby.

## Przeciwwskazania

Lek Nasivin Sinex i Eukaliptus nie powinien być stosowany w poniższych przypadkach:

- Gdy występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu;
- U pacjentów stosujących inhibitory monoaminoooksydazy (IMAO) lub u pacjentów, którzy przyjmowali inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni;
- U pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania;
- U pacjentów po przezklinowej hipofizektomii;
- W razie zapalenia skóry lub błony śluzowej przedstonka nosa i wysychającego zapalenia błony śluzowej nosa;
- U pacjentów z ostrą chorobą wieńcową lub dusznością w przebiegu niewydolności serca.

## Środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca, w tym dławicą piersiową, nadczynnością tarczycy, cukrzycą i rozrostem gruczołu krokowego.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie po 3 dniach stosowania leku, lekarz powinien ponownie ocenić stan pacjenta.

Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus może być stosowany przez maksimum 7 kolejnych dni, aby uniknąć efektu odbicia i zapalenia błony śluzowej nosa spowodowanego lekami.

Lek zawiera benzalkoniowy chlorek. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa, szczególnie podczas długotrwałego stosowania. Jeśli taka reakcja (przewlekła niedrożność nosa) jest podejrzewana, należy stosować inne leki do nosa nie zawierające środków konserwujących, jeśli możliwe. Jeśli leki do stosowania do nosa bez środków konserwujących są niedostępne, należy rozważyć zastosowanie leku w innej postaci.

Lek zawiera alkohol benzylowy. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne i/lub łagodne miejscowe podrażnienie.

## Stosowanie innych leków

Produktu nie należy stosować w skojarzeniu z inhibitorami MAO lub przez okres do 2 tygodni po stosowaniu inhibitorów MAO, ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji prowadzących do nadciśnienia tętniczego.

Produkt ten wchodzi w interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, powodując zwiększenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego i arytmii serca.

Działanie beta-adrenolityków i innych leków przeciwnadciśnieniowych, takich jak metyldopy, betanidyny, debryzochiny i guanetydyny może być antagonistyczne.

Podczas jednoczesnego stosowania sympatykomimetyków i leków stosowanych w chorobie Parkinsona, takich jak bromokryptyna, rozwijać się może nasilona toksyczność sercowo-naczyniowa.

## Ciąża i karmienie piersią

### Ciąża

Brak jest danych klinicznych dotyczących ekspozycji kobiet w ciąży na chlorowodorek oksymetazoliny. Wyniki badań na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, poród i rozwój pourodzeniowy.

### Karmienie piersią

Brak jest danych klinicznych wskazujących na przenikanie oksymetazoliny chlorowodoru do mleka matki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, ponieważ przedawkowanie może zmniejszyć przepływ krwi łożyskowej i wytwarzanie mleka.

Z powodu niewystarczających danych, produktu nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia piersią, chyba że na polecenie lekarza

## Prowadzenie pojazdów

Nasivin Sinex Aloes i Eukaliptus nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

## Działania niepożądane

Jak każdy lek, również ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do niezbyt często występujących (mniej niż 1 na 1000, więcej niż 1 na 100) działań niepożądanych należą: kichanie, suchość i podrażnienie błony śluzowej nosa, jamy ustnej i gardła.

Do rzadko występujących (mniej niż 1 na 1000) działań niepożądanych należą: lęk, sedacja, drażliwość, zaburzenia snu, tachykardia, kołatanie serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, przekrwienie reaktywne, ból głowy, nudności, wysypka, zaburzenia widzenia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**