

# Nasometin 50 µg/daw. 18 g

Nasza cena: 7,51 zł

## Opis słownikowy

|                   |   |
|-------------------|---|
| Opakowanie        | *140 DAWEK  |
| Postać            | AER.DO NOSA   |
| Producent         | LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY SŁOWENIA [SI] |
| Rejestracja       | Lek na receptę  |
| Substancja czynna | MOMETASONUM   |

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

#### Produkt wskazany jest do stosowania w:

- leczeniu objawów sezonowego alergicznego,
- całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i u dzieci w wieku 3 lat i starszych,
- leczeniu polipów nosa u dorosłych w wieku co najmniej 18 lat.

### Dawkowanie:

#### Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) oraz dzieci w wieku 12 lat i starsze:

Zazwyczaj zalecana dawka wynosi dwa rozpylenia produktu leczniczego (50 µgramów na rozpylenie) do każdego otworu nosowego raz/dobę (całkowita dawka 200 µgramów).

#### Dzieci w wieku od 3 do 11 lat:

Zazwyczaj zalecaną dawką jest 1 rozpylenie (50 µgramów na rozpylenie) do każdego otworu nosowego raz/dobę (całkowita dawka 100 µgramów).

W celu zapoznania się ze szczegółowym sposobem podawania leku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub też zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania.

### Działanie:

- przeciwzapalne po podaniu w dawkach, które nie mają działania ogólnoustrojowego.

## Skład:

1 rozpylenie dostarcza 50 µg mometazonu furoinianu w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego.

## Przeciwwskazania:

### Produkt jest przeciwwskazany do stosowania:

- przez pacjentów u których stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną (mometazonu furoinian) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- u pacjentów z nieleczonym miejscowym zakażeniem błony śluzowej nosa, takim jak opryszczka.
- u pacjentów po przebytych zabiegach chirurgicznych nosa lub urazie nosa (do czasu pełnego wyleczenia) ze względu na hamujące gojenie się ran działanie kortykosteroidów.

## Działania niepożądane:

Niektóre działania niepożądane mogą pojawiać się często, jednakże nie zawsze dotyczą one wszystkich pacjentów. W razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

- zapalenie gardła,
- zakażenie górnych dróg oddechowych-notowane,
- ból głowy,
- krwawienie z nosa,
- odczucie pieczenia w nosie,
- podrażnienie błony śluzowej nosa,
- owrzodzenie błony śluzowej nosa,
- podrażnienie gardła.

Więcej informacji na temat działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką informacyjną.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.