

## Naturell Lactifer, 15 kapsułek

Nasza cena: 34,59 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	*15
Postać	kapsułki
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety

### Opis produktu

#### OPIS

**Suplement diety Naturell Lactifer** to produkt zawierający laktoferynę wzbogacony o liposomalną witaminę C oraz inulinę. Produkt przeznaczony dla **dzieci i osób dorosłych**. Preparat może być stosowany przez **kobiety w ciąży i karmiące piersią**.

Zawiera laktoferynę z mleka krowiego.

Nie zawiera substancji wypełniających, barwników, konserwantów syntetycznego pochodzenia.

Bez dodatku cukru.

Produkt bezglutenowy.

#### SKŁADNIKI

laktoferyna z **mleka krowiego**; żelatyna; witamina C (kwas L-askorbinowy); inulina.

Składniki	1 kapsułka	%RWS*	2 kapsułki		
Laktoferyna	100 mg	-	200 mg		
Witamina C	40 mg	50%	80 mg		
Inulina	55 mg	-	110 mg		

\*Referencyjna Wartość Spożycia

#### WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

**Witamina C** - wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz zwiększa przyswajanie żelaza.

#### MASA NETTO

15 kapsułek

**SPOSÓB UŻYCIA**

**Dzieci:** 1 kapsułka na dobę.

**Dorośli:** 2-4 kapsułki na dobę.

Kapsułkę można połknąć lub jej zawartość wysypać i rozpuścić w niewielkiej ilości płynu (wody lub mleka, jogurtu, kefiru, innego płynu) o temperaturze poniżej 37°C. Dobrze wymieszać. Laktoferyna ulega denaturacji, dlatego nie należy dodawać jej do gorącego płynu.

Rekomendowany okres suplementacji: 3 miesiące.

**PRZECHOWYWANIE**

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed wilgocią i światłem

**PRODUCENT / DYSTRYBUTOR**

USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.