

Naxii, 220mg, 10 tabletek



Nasza cena: 10,44 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,22 G
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	NAPROXENUM

Opis produktu

Opis

Naxii, tabletki powlekane to sól sodowa naproksenu. Jest to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy.

Dawkowanie - Naxii, 220mg, 10 tabletek

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletkę co 8-12 godzin. Można stosować 2 tabletki na początku, następnie 1 tabletkę co 12 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 3 tabletki na dobę, chyba że lekarz przepisze inaczej.

Pacjenci w wieku podeszłym: nie należy przyjmować więcej niż 1 tabletkę co 12 godzin, chyba że lekarz przepisze inaczej.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez konsultacji z lekarzem.

Składniki - Naxii, 220mg, 10 tabletek

1 tabletkę powlekaną zawiera:

substancję czynną - sól sodową naproksenu 220mg oraz

substancje pomocnicze, skład rdzenia: talk, powidon, laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna, skład otoczki: opadry Ligth Blue YS-2-10657*.

*hydroksypropylometyloceluloza, glikol propylenowy, dwutlenek tytanu i lak aluminowy z indygotyną.

Działania

Lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy.

Wskazania - Naxii, 220mg, 10 tabletek

- bóle reumatyczne,
- bóle pleców,

- bóle mięśni,
- bóle głowy,
- bóle menstruacyjne,
- bóle związane z przeziębieniem,
- bóle zębów,
- gorączka.

Przeciwwskazania - Naxii, 220mg, 10 tabletek

Nie należy stosować leku, jeśli:

- Wcześniej występowały objawy alergii na którykolwiek składnik preparatu, wykazano nadwrażliwość (katar, napad astmy, pokrzywka) na kwas acetylosalicylowy lub inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
- Występują następujące schorzenia: czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek. Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.
- Nie stosować z innymi lekami z grupy NLPZ.
- Nie stosować w okresie karmienia piersią. Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania - Naxii, 220mg, 10 tabletek

Jak każdy lek, lek Naxii może powodować działania niepożądane. Przyjmowanie takich leków, jak Naxii, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca - (zawał) serca lub udaru.

Poniżej wymienione działania niepożądane zostały sklasyfikowane według układów/narządów, których dotyczą oraz częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo częste (u więcej niż stu dziesięciu osób), częste (u mniej niż jednej na dziesięć osób), niezbyt częste (u mniej niż jednej na sto osób), rzadkie (u mniej niż jednej na tysiąc osób), bardzo rzadkie (u mniej niż jednej na dziesięć tysięcy osób).

- Zaburzenia żołądka i jelit: częste: bóle brzucha, nudności, zaparcia, zgaga; niezbyt częste: biegunka, niestrawność, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; rzadkie: krwawienie lub perforacje przewodu pokarmowego niezbyt okężnicy, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem lub perforacją, wymioty, wymioty z krwią.
- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: rzadkie: żółtaczką, zapalenie wątroby.
- Zaburzenia układu nerwowego: częste: ból głowy, senność, zawroty głowy; niezbyt częste: uczucie oszołomienia, bezsenna; bardzo rzadkie: drgawki, zapalenie opon mózgowych.
- Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: niezbyt częste: bóle lub osłabienie siły mięśniowej.
- Zaburzenia psychiatryczne: rzadkie: depresja, niezwykłe sny.
- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: częste: obrzęki; rzadkie: ogólne złe samopoczucie, trudności w koncentracji, dreszcze, gorączka.
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: częste: świąd, wybroczyny, wysypka, nadmierne pocenie; niezbyt częste: plamica; rzadkie: nadwrażliwość na światło, łysienie, toksyczna rozplywna martwica naskórka (ang. TEN).
- Zaburzenia ucha i błędnika: częste: szumy uszne; niezbyt częste: zaburzenia słuchu; rzadkie: niedosłuch.
- Zaburzenia oka: niezbyt częste: zapalenie nerwu wzrokowego, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, zmętnienie rogówki.
- Zaburzenia serca: częste: duszność; niezbyt częste: kołatanie serca; rzadkie: niewydolność serca.
- Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie.
- Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: częste: nadmierne pragnienie; rzadkie: hiperkaliemia.
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych: rzadkie: kłębuszkowe zapalenie nerek, krwiomocz, martwica brodawek nerkowych, niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy.
- Zaburzenia krwi i układu chłonnego: rzadkie: agranulocytoza, eozynofilia, granulocytopenia, leukopenia, trombocytopenia.
- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: rzadkie: eozynofilowe zapalenie płuc
- Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: rzadkie: zaburzenia miesiączkowania.
- Zaburzenia układu immunologicznego: rzadkie: reakcje anafilaktyczne.

Uwagi

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25 C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

