

Nedal 5 mg 28 tabletek

Nasza cena: 8,46 zł

Opis słownikowy

Dawka	5MG
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	NEBIVOLOLUM

Opis produktu

Opis

Nedal 5 mg 28 tabletek

Wskazania:

- leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego,
- przewlekła niewydolność serca,
- leczenie stabilnej, łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca,
- choroba wieńcowa,
- leczenie objawowe stabilnej choroby wieńcowej serca.

Dawkowanie:

Nadciśnienie tętnicze:

- dawka początkowa leku wynosi 5 mg na dobę co odpowiada 1 tabletkę,
- lek najlepiej przyjmować każdego dnia o stałej porze,
- odpowiednie działanie leku można zaobserwować po ok. 1 – 2 tygodniach stosowania.

Dawka leku jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od przebiegu choroby. Lek powinien być stosowany pod

nadzorem lekarza prowadzącego i według jego ścisłych wskazań. Mnie należy samodzielnie modyfikować dawki leku.

Działanie:

- działanie farmakologiczne: jest konkurencyjnym i wybiórczym antagonistą receptorów beta-adrenergicznych: działanie to przypisywane jest enancjomerowi SRRR (d-enancjomerowi);
- wykazuje łagodne działanie rozszerzające naczynia, które wynika z oddziaływania na szlak przemian metabolicznych L-argininy/tlenku azotu.
- powoduje zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia tętniczego w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego, zarówno u osób z prawidłowym ciśnieniem, jak i z nadciśnieniem tętniczym.
- działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia.
- dochodzi do zmniejszenia układowego oporu naczyniowego.

Skład:

1 tabletkę zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodoru.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjentów występują dolegliwości:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby,
- ostra niewydolność serca,
- wstrząs kardiogeny,
- zespół chorej zatoki,
- skurcz oskrzeli,
- astma oskrzelowa,
- nieleczonego guza chromochłonny nadnerczy,
- kwasica metaboliczna,
- bradykardia,
- niedociśnienie tętnicze,
- ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego.

Działania niepożądane:

Do najczęstszych działań niepożądanych występujących podczas stosowania leku należą:

- bóle głowy,
- zawroty głowy,

- parestezje,
- duszność,
- zaparcia,
- nudności,
- biegunka,
- zmęczenie,
- obrzęk.

Powyżej zostały wymienione tylko niektóre z działań niepożądanych. Działania te nie muszą występować u wszystkich pacjentów stosujących lek. Również przebieg działań może różnić się u różnych pacjentów. W celu poznania innych działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką informacyjną bądź też skonsultować się z lekarzem prowadzącym. W momencie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych fakt ten należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.