

Neo-Angin Wiśnia, 24 tabletki

Nasza cena: 18,90 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*24
Postać	Tabletki
Producent	DIVAPHARMA-KNUFINKE ARZNEIMITTELWERK BER NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DICHLOROBENZYL ALCOHOL, AMYLMETHACRESOLU

Opis produktu

Opis

Neo-angin wiśnia to lek w postaci tabletek twardych do ssania zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Dawkowanie - Neo-Angin Wiśnia, 24 tabletki

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: należy powoli ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Składniki - Neo-Angin Wiśnia, 24 tabletki

Jedna tabletkę zawiera substancje czynne:

- alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 1,2 mg,

- amyloetakrezol 0,6 mg,

- lewomentol 5,72 mg,

oraz substancje pomocnicze: olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, maltitol (likazyna), kwas winowy, czerwień koszenilową A (E124).

Działania

Substancje czynne zawarte w preparacie wykazują działanie bakteriobójcze na większość Gram-dodatnich i Gram-ujemnych bakterii wywołujących infekcje w jamie ustnej i gardle, a także przeciwgrzybiczym na grzyby powodujące pleśniawki. Neo-angin ma przyjemny smak i jest dobrze tolerowany.

Wskazania - Neo-Angin Wiśnia, 24 tabletki

Zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania - Neo-Angin Wiśnia, 24 tabletki

W przypadku występowania reakcji alergicznej na którykolwiek ze składników leku.
Występowanie u pacjenta nietolerancji fruktozy.

Przeciwwskazania - Neo-Angin Wiśnia, 24 tabletki

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego. Mogą również wystąpić reakcje alergiczne

Uwagi

Poinformuj lekarza:

Gdy masz uczulenie na składniki preparatu, nietolerancję fruktozy. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu Neo-Angin Wiśnia w okresie ciąży i karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.