

Neogardin Forte, 10 tabletek



Nasza cena: 5,16 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	Uniphar Sp.z O.o. Polska [PI]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Neogardin Forte, 10 tabletek

Preparat zawiera substancje wspomagające prawidłowe funkcjonowanie gardła.

Dawkowanie - Neogardin Forte tabletki x 10

Ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny: od 1 do 4 tabletek dziennie.

Składniki - Neogardin Forte tabletki x 10

1 tabletkę: ksylitol 364 mg, suchy miód 250 mg, suchy wyciąg z szalwii 150 mg, lecytyna sojowa 50 mg, olejek eukaliptusowy 13,75 mg, olejek szalwiowy 12,5 mg, laktoferyna 3 mg, glicerol 2,5 mg, mentol 0,75 mg, laktoza, sacharoza, sorbitol, kwas askorbinowy, cyklaminian sodu, sacharyna, kwas cytrynowy, stearynian magnezu, talk, kwas krzemowy, maltodekstryna, aromaty identyczne z naturalnymi.

Działania

Preparat na gardło. Substancje aktywne zawarte w produkcie są pochodzenia naturalnego. Mają właściwości antybakteryjne, wzmacniające układ odpornościowy, kojące, odkażające i nawilżają śluzówkę.

Laktoferyna - wzmacnia układ odpornościowy, działa antybakteryjnie, hamuje aktywność chorobotwórczych pasożytów i grzybów.

Ksylitol - działa bakteriobójczo, likwiduje suchość w gardle oraz nieprzyjemny zapach z ust.

Szałwia - działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie.

Eukaliptus - działa przeciwbakteryjnie, wykrztuśnie i przeciwzapalnie.

Mentol - zmniejsza wrażliwość włókien czuciowych przewodzących ból.

Miód - działa przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Lecytyna - nawilża i odżywia śluzówkę jamy ustnej i gardła.

Glicerol - nawilża śluzówkę jamy ustnej i gardła, ułatwia wchłanianie substancji czynnej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.