


# Ungentum Neomycini, maść 0,5%, 10 saszetek po 1 g

Nasza cena: 14,02 zł



## Opis słownikowy

Dawka	1G
Opakowanie	*10 sasz.
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY RZESZÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	NEOMYCINUM

## Opis produktu

### OPIS

**Ungentum Neomycini, 5 mg/g to produkt leczniczy** w postaci maści do stosowania na skórę z Lek ten zawiera antybiotyk neomycynę, należący do antybiotyków aminoglikozydowych.

### SKŁAD

- **Substancją czynną** leku jest neomycyny siarczan.
- 1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu.
- Pozostałe składniki to: wazelina biała, parafina ciekła.

### DZIAŁANIE LEKU

Neomycyna działa bakteriobójczo na gronkowce i liczne bakterie Gram - ujemne, w tym na *Escherichia coli*, *Haemophilus influenza* i bakterie z rodzaju *Klebsiella*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Salmonella* i *Shigella* oraz na prątki kwasooporne, w tym także odporne na streptomycynę szczepy *Mycobacterium tuberculosis*. Neomycyna nie działa na bakterie *Pseudomonas aeruginosa* i bakterie z rodzaju *Streptococcus* oraz nie działa na grzyby, drożdżaki i wirusy.

### DAWKOWANIE

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy przekłuć membranę tuby odwrotną stroną nakrętki. W przypadku saszetki rozerwać opakowanie; maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą maści 2 do 4 razy na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

### WSKAZANIA

Ungentum Neomycini stosuje się w miejscowym leczeniu ropnych chorób skóry, zwłaszcza wywołanych przez gronkowce (np. czyrączność, liszajec gronkowcowy), w leczeniu ropnych powikłań alergicznych chorób skóry, w zakażonych niewielkich oparzeniach i odmrożeniach.

#### PRZECIWWSKAZANIA

Kiedy nie stosować Unguentum Neomycini:

- jeśli pacjent ma uczulenie na neomycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w okresie ciąży i karmienia piersią;
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat;
- jeśli u pacjenta stwierdzono uszkodzenie słuchu;
- na duże powierzchnie uszkodzonej skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żyłakowe lub długotrwałe, ze względu na ryzyko działania uszkodzającego słuch lub nerki;
- jednocześnie z lekami działającymi toksycznie na narząd słuchu, nerki lub układ nerwowy;
- w podeszłym wieku;
- w zaburzeniach czynności nerek;
- w zaburzeniach słuchu lub równowagi

#### DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE / SKUTKI UBOCZNE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić odczyny i podrażnienia skórne, zmiany alergiczne, zaczerwienienia, rumień, obrzęk, świąd, odczyny toksyczne oraz zmiany o charakterze wypryskowym.

#### OSTRZEŻENIA

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Unguentum Neomycini należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie należy stosować leku przez dłuższy czas, gdyż powoduje to narastanie oporności bakterii, a także może spowodować nadkażenie grzybicze.
- Lek stosowany miejscowo, zwłaszcza na otwarte rany i przez dłuższy czas, może być ototoksyczny (uszkadzać słuch i narząd równowagi) i nefrotoksyczny (powodować uszkodzenie nerek)

#### INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W trakcie stosowania leku Unguentum Neomycini na skórę, może wystąpić krzyżowa reakcja uczuleniowa neomycyny z paramycyną, kanamycyną, tobramycyną, amikacyną i izepamycyną.

Jednoczesne lub następcze stosowanie doustne lub miejscowe neomycyny i innych antybiotyków aminoglikozydowych (np. paromomycyny) lub innych leków o możliwym działaniu toksycznym na nerki lub układ nerwowy (np. bacytracyny, cisplatyny, wankomycyny, amfoterycyny B, polimyksyny B, kolistyny, wariomycyny) jest przeciwwskazane, ze względu na ryzyko sumowania się toksycznych działań niepożądanych.

#### CIĄŻA I KARMIE NIE PIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Unguentum Neomycini u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

#### STOSOWANIE U DZIECI

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

#### PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGA MASZYN

Maść Unguentum Neomycini nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać maści w otwartej saszetce, maść zastosować bezpośrednio po otwarciu saszetki.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**