


## Neoprobio globułki dopochwowe x 10



Nasza cena: 15,23 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	GLOB.DOPOCH.
Producent	Farmina Kraków
Rejestracja	Bez recepty

### Opis produktu

#### Opis

Neoprobio jest preparatem probiotycznym zalecanym w schorzeniach przebiegających z zaburzeniami składu jakościowego i ilościowego flory bakteryjnej dróg rodnych kobiet (dysbakterioza, zakażenia bakteryjne lub bakteryjno-grzybicze pochwy). Neoprobio może być również stosowany pomocniczo w przypadkach nieswoistych zapaleń pochwy u kobiet, u których stwierdzono podwyższone pH wydzieliny pochwy, oraz profilaktycznie.

#### Wskazania:

Neoprobio stosuje się w schorzeniach objawiających się zaburzeniami składu jakościowego i ilościowego flory bakteryjnej dróg rodnych kobiet (dysbakterioza, zakażenia bakteryjne lub bakteryjno-grzybicze pochwy). Neoprobio może być również stosowany pomocniczo w przypadkach nieswoistych zapaleń pochwy u kobiet, u których stwierdzono podwyższone pH wydzieliny pochwy. Neoprobio stosowany profilaktycznie pomaga utrzymywać dogodne warunki dla rozwoju naturalnej flory bakteryjnej pochwy.

#### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

#### Skład:

Liofilizat trzech szczepów probiotycznych z rzędu Lactobacillales: Lactobacillus plantarum 200D, Enterococcus faecium 77D, Enterococcus durans Sm. Jedna globulka zawiera około 109 CFU\* (nie mniej niż 107), czyli miliard żywych bakterii szczepów probiotycznych z rzędu Lactobacillales. \*CFU - (ang. Colony Forming Unit) – jednostka tworząca kolonię. Ponadto laktoza, kwas askorbinowy – witamina C, kwas foliowy – witamina B9, tłuszcz obojętny – podłoże gałkowe

#### Sposób użycia:

Jedna (najlepiej przed snem) do dwóch globulek dziennie (jedną rano a drugą na noc) przez 10 dni. Przed zastosowaniem preparatu dokładnie umyć dłonie. Globulkę umieścić głęboko w pochwie. W przypadku wątpliwości co do dawkowania i sposobu użycia należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Jeżeli po kilkudniowym stosowaniu preparatu dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem. Stosowanie preparatu u młodych dziewcząt należy skonsultować z lekarzem ginekologiem.

