

# Neosine forte 1000 mg, 30 tabletek

Nasza cena: 52,38 zł



## Opis słownikowy

Dawka	1000 MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	AFLOFARM SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	INOSINUM

## Opis produktu

### Opis

## Neosine forte 1000 mg, 30 tabletek

**Neosine forte tabletki** to lek o działaniu przeciwwirusowym oraz immunostymulującym. Produkt leczniczy zawiera podwójną dawkę substancji czynnej inozyny pranobeks dostępnej bez recepty. Polecany jest wspomagająco dla osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Dodatkowo, inozyna hamuje namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes, wywołujących opryszczkę warg i skóry twarzy.

### Wskazania:

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołane przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

### Przeciwwskazania:

#### Produktu leczniczego nie należy stosować:

- u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- u pacjentów u których występuje aktualnie napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

### Zalecana dawka:

**Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):**

Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę - zwykle 1 g, tj. 1 tabletkę 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej, niż 4 tabletki na dobę.

**Dzieci w wieku powyżej 1 roku:**

Zalecana dawka to 50 mg na kg masy ciała na dobę, podawana w kilku dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie umieją połyknąć tabletek, zaleca się podawanie leku Neosine forte w syropie.

**Sposób podawania:**

Tabletkę należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wodą. W razie trudności z połykaniem całej tabletki, w celu ułatwienia przyjęcia leku, tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w nie wielkiej ilości wody

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**