

## Neosine Forte syrop, 100 ml



Nasza cena: 25,59 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,5 G/5ML
Opakowanie	100 ml
Postać	SYROP
Producent	AFLOFARM SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	INOSINUM

### Opis produktu

#### Opis

### Neosine Forte syrop, 100 ml

Neosine Forte jest to lek w postaci syropu, który zawiera skoncentrowaną dawkę inozyny1 – 500 mg na 5 ml syropu. Syrop o smaku bananowym.

Neosine Forte jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu.

Lek Neosine Forte zawiera substancję czynną inozyny pranobeks, która hamuje in vitro namnażanie chorobotwórczych dla człowieka wirusów z grupy Herpes.

#### Wskazania:

- Lek należy stosować wspomagająco u osób o obniżonej odporności
- Nawracające infekcje dróg oddechowych
- Opryszczka warg
- Opryszczka skóry twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

#### Uwaga!

Lek Neosine forte może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

#### Dawkowanie:

**Osoby dorosłe (w tym powyżej 65 lat).**

Zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (0,5 ml na 1 kg mc. na dobę), zwykle 3 g (czyli 30 ml syropu na dobę), podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia.

Zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę, zwykle 0,5 ml syropu na 1 kg masy ciała w 3 lub 4 równych dawkach podzielonych podawanych w ciągu doby.

Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Kiedy ustąpią objawy, to lek należy stosować jeszcze przez 1 do 2 dni.

<b>Masa ciała dziecka</b>	<b>Dawka (ml syropu)</b>
	<b>Stosować 3 razy na dobę</b>
10 do 14 kg	2,5 ml
15 do 20 kg	2,5 do 3,5 ml
21 do 30 kg	3,5 do 5 ml
31 do 40 kg	5 do 7,5 ml
41 do 50 kg	7,5 do 9 ml

**Skład leku:****Substancja czynna**

inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3).

1ml syropu zawiera 100mg inozyny pranobeksu.

5ml syropu zawiera 500mg inozyny pranobeksu.

**Pozostałe składniki:**

metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sacharoza, sacharyna sodowa, kwas cytrynowy, wodorotlenek sodu, glikol propylenowy, aromatbananowy AR 0010, woda oczyszczona.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**