

Neurotop Retard 600 mg 50 tabletek

Nasza cena: 3,20 zł

Opis słownikowy

Dawka	600MG
Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH AUSTRIA [AT]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	CARBAMAZEPINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania w takich schorzeniach jak:

- padaczka,
- zespoły maniakalne,
- zapobieganie zaburzeniom maniakalno-depresyjnym (dwubiegunowym),
- alkoholowy zespół abstynencyjny,
- idiopatyczny nerwoból nerwu trójdzielnego,
- nerwoból nerwu trójdzielnego w przebiegu stwardnienia rozsianego.

Dawkowanie:

Dawka leku ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań oraz wywiadu. Produkt może być stosowany przez osoby dorosłe oraz dzieci w wieku powyżej 10 lat.

- zazwyczaj terapię początkowa powinna rozpoczynać się od 2 tabletek w dawce 150 mg na dobę,
- w razie konieczności dawkę można stopniowo zwiększać do osiągnięcia indywidualnej, optymalnej dawki,

- zaleca się zwiększanie dawki wieczornej a nie porannej,
- dawka podtrzymująca wynosi 600 mg/dobę,
- jeżeli tabletki jest przyjmowana raz dziennie, zazwyczaj należy przyjmować ją wieczorem.

Działanie:

- przeciwdrgawkowe,
- przeciwcholinergiczne,
- uspokajające,
- przeciwdepresyjne,
- antydiuretyczne.

Skład:

1 tabletki zawiera 600 mg karbamazepiny.

Przeciwwskazania:

Produktu nie należy stosować u pacjentów u których stwierdzono:

- nadwrażliwość na karbamazepinę lub leki o podobnej budowie chemicznej
- nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych
- blok przedsionkowo-komorowym
- zaburzenia czynności szpiku kostnego
- porfirię wątrobową

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane.

Do najczęstszych z nich należą:

- bóle i zawroty głowy,
- niezdolność ruchowa,
- senność,
- zmęczenie,
- podwójne widzenie,
- nudności,
- wymioty,
- alergiczne odczyny skórne,

- leukopenia,
- małopłytkowość,
- eozynofilia,
- obrzęk, zatrzymanie płynów,
- zwiększenie masy ciała,
- hiponatremia,
- ataksja,
- senność,
- zmęczenie,
- suchość w ustach,
- zwiększenie aktywności gammaglutamylotransferazy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Wszelkich niezbędnych informacji może udzielić również farmaceuta. Jeżeli podczas stosowania leku wystąpią jakiegokolwiek z niepokojących działań niepożądanych należy skonsultować się niezwłocznie z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.