

# Nicorette Classic, guma do żucia, 4 mg, 105 sztuk



Nasza cena: 98,17 zł

## Opis słownikowy

Dawka	4MG
Opakowanie	*105
Postać	GUMA DO ŻUCIA LECZ.
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHN WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	NICOTINUM

## Opis produktu

### Opis

#### Nicorette Classic, guma do żucia, 4 mg, 105 sztuk

Lecznicza guma Nicorette wskazania jest w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu, poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego oraz objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia.

#### Dawkowanie - Nicorette Classic, guma do żucia, 4 mg, 105 szt.

Bez zalecenia lekarza nie stosować u osób poniżej 18 roku życia. Wstępna dawka powinna zostać dobrana indywidualnie w zależności od stopnia uzależnienia od nikotyny. Zazwyczaj stosuje się 8-12 gum o odpowiedniej zawartości nikotyny na dobę. Osoby palące o niskim stopniu uzależnienia (Test Fagerstroma uzależnienia

#### Składniki - Nicorette Classic, guma do żucia, 4 mg, 105 szt.

Jedna kostka gumy Nicorette zawiera 4 mg nikotyny w postaci kompleksu żywicy nikotynowej 20% oraz substancje pomocnicze: bezwodny węgiel sodu, guma bazowa, sorbitol proszek, aromat smakowy ZD-49284, aromat smakowy 83.6422, gliceryna 85%, zółcień chinolowa.

### Działania

Gdy pacjent zaprzestaje palenia papierosów i nikotyna przestaje być regularnie dostarczana do organizmu, zaczynają się pojawiać różne objawy wynikające z odstawienia nikotyny, między innymi drażliwość, niepokój, zaburzenia nastroju, zawroty i bóle głowy oraz zaburzenia snu. Za pomocą gumy Nicorette można im zapobiec lub je osłabić dostarczając do organizmu w krótkim czasie niewielkie dawki nikotyny.

## Wskazania - Nicorette Classic, guma do żucia, 4 mg, 105 szt.

Uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu

## Przeciwwskazania - Nicorette Classic, guma do żucia, 4 mg, 105 szt.

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

## Przeciwwskazania - Nicorette Classic, guma do żucia, 4 mg, 105 szt.

Większość objawów niepożądanych występuje w ciągu pierwszych 3-4 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Podczas pierwszych dni stosowania najczęściej zgłasza się podrażnienie gardła oraz zwiększone wydzielanie śliny. Nadmierne połykanie uwolnionej nikotyny może początkowo powodować czkawkę. Wymienione działania niepożądane ustępują zwykle po kilku dniach leczenia. Jeżeli występują nadal należy skonsultować się z lekarzem.

Do innych objawów niepożądanych należą:

- bardzo często: bóle głowy, uczucie dyskomfortu, czkawka,
- często: zawroty głowy, nudności, wymioty,
- niezbyt często: kołatanie serca, rumień pokrzywka,
- rzadko i bardzo rzadko: przejściowe migotanie przedsionków, bóle jamy ustnej i gardła, bóle mięśni żuchwy, reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy.

U niektórych osób mogą wystąpić inne objawy niepożądane niewymienione wyżej. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza.

## Uwagi

Przed zastosowaniem w ciąży i okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**