

# Nifuroksazyd Hasco, tabletki, 100 mg, 24 szt.



Nasza cena: 7,35 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,1 G
Opakowanie	*24
Postać	Tabletki
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	NIFUROXAZIDUM

## Opis produktu

### Opis

Preparat stosowany w ostrej lub przewlekłej bieguncie w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

### Dawkowanie - Nifuroksazyd Hasco, tabletki, 100 mg, 24 szt.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.

### Składniki - Nifuroksazyd Hasco, tabletki, 100 mg, 24 szt.

1 tabletki zawiera:

Substancje czynne: Nifuroksazyd 100 mg

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian.

Skład otoczki: alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, lak aluminiowy żółcieni chinolinowej E104, talk, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa E110, lak aluminiowy indygo-karminy E132.

### Działania

Nifuroksazyd wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenie jelitowe. Lek działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus oraz drobnoustroje Gram-ujemne. Nie działa na bakterie z rodzaju Proteus, Pseudomonas, Providentia. Nie zaburza prawidłowej równowagi mikrobiologicznej przewodu pokarmowego.

Lek działa szybko, wyłącznie w świetle jelit, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie wywiera działania ogólnego. Jest szybko wydalany z organizmu.

### Wskazania - Nifuroksazyd Hasco, tabletki, 100 mg, 24 szt.

Lek stosuje się w ostrej lub przewlekłej bieguncie w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

**Przeciwwskazania - Nifuroksazyd Hasco, tabletki, 100 mg, 24 szt.**

Nadwrażliwość na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

**Przeciwwskazania - Nifuroksazyd Hasco, tabletki, 100 mg, 24 szt.**

Nifuroksazyd jest zwykle dobrze tolerowany. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**