

# Nilogrin 10 mg 60 tabletek

Nasza cena: 46,57 zł

## Opis słownikowy

Dawka	10 MG
Opakowanie	*60
Postać	TABL.POWL.
Producent	POLFA PABIANICE POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	NICERGOLINUM

## Opis produktu

### Opis

## Nilogrin 10 mg, 60 tabletek

### Co to jest lek Nilogrin i w jakim celu się go stosuje

Nilogrin zawiera jako substancję czynną nicergolinę – syntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu o wielokierunkowym działaniu na metabolizm mózgu oraz krążenie mózgowe i obwodowe.

### Wskazania do stosowania:

- Łagodne oraz umiarkowane otępienie.

### Skład:

- Substancją czynną leku jest nicergolina.
- Pozostałe substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, alkohol poliwinylowy, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.
- Skład otoczki: hypromeloza E 15, hypromeloza E 5, makrogol 8000, hydroksypropyloceluloza, tytanu dwutlenek (E 171).

### Przeciwwskazania:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na nicergolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Ostry krwotok mózgowy.
- Niedociśnienie tętnicze lub skłonność do ortostatycznych (związanych z postawą stojącą)
- spadków ciśnienia krwi.
- Ciąża i karmienie piersią.

- Świeży zawał mięśnia sercowego.
- Ciężka bradykardia (wolne bicie serca).
- Jednoczesne stosowanie leków  $\beta$ -adrenomimetycznych (np. adrenalina).

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

## Dorośli:

Dawkę ustala się indywidualnie, w zależności od reakcji na leczenie.

Dawki dobowe nicergoliny wynoszą od 10 do 60 mg. Najczęściej podaje się 30 mg na dobę (3 razy po 1 tabletkę 10 mg) lub 60 mg na dobę (2 razy po 1 tabletkę 30 mg).

U pacjentów wrażliwych, u których nicergolina powoduje trudności w zasypianiu lub bezsenność, zaleca się podawanie w dwóch dawkach dobowych, rezygnując z dawki wieczornej przyjmowanej przed udaniem się na spoczynek. U pacjentów wymagających podawania nicergoliny raz na dobę, całą dawkę leku należy podawać rano.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Nilogrin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nicergolina jest na ogół dobrze tolerowana; większość działań niepożądanych ma niewielkie nasilenie i przemijający charakter, zazwyczaj niepowodując konieczności przerywania leczenia. Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane nicergoliny zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

- Zaburzenia serca, zaburzenia naczyniowe
- Niedociśnienie, bradykardia (rzadkoskurcz).
- Zaburzenia układu nerwowego
- Nadmierna potliwość, zaburzenia snu, omdlenia, pobudzenie, senność, zawroty głowy, bezsenność, niepokój, uderzenia gorąca (uczucie gorąca i zaczerwienienie twarzy), zwiększenie apetytu.
- Zaburzenia żołądka i jelit
- Nudności, wymioty, nadkwaśność treści żołądka, zgaga.
- Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
- Niemożność osiągnięcia ejakulacji (objaw taki jest znanym działaniem niepożądanym leków  $\alpha$ -adrenolitycznych).
- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
- Zmiany w opłucnej i w płucach. Objawy ustępują zwykle po upływie kilku miesięcy od odstawienia pochodnej ergoliny.
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
- Rumień, pokrzywka.
- Zaburzenia układu immunologicznego
- Reakcje nadwrażliwości.
- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
- Złe samopoczucie.
- U niektórych osób w czasie stosowania preparatu Nilogrin mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce należy zasięgnąć porady lekarza.

## Nilogrin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nicergolina może zwiększać działanie leków przeciw nadciśnieniu, leków przeciwplatek (np. kwas acetylosalicylowy) i przeciwzakrzepowych.

Alkohol może zwiększać działanie niepożądane nicergoliny na ośrodkowy układ nerwowy.

## Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Leku nie należy stosować w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

## Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Ponieważ nicergolina może wywoływać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. senność i zawroty głowy), nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli występują takie objawy.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.