

## Niquitin, plastry przezroczyste, 14 mg, 7 szt.



Nasza cena: 82,41 zł

### Opis słownikowy

Dawka	14MG
Opakowanie	*7
Postać	PLAST.PRZEZRO.
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	NICOTINUM

### Opis produktu

#### Opis

#### Skład:

(1 plaster zawiera): Substancją czynną leku jest nikotyna 78 mg (14 mg/24 godz.).

Inne składniki leku to: kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalan/etylenowinylooctan, film polietylenowy, poliizobutylen, silikonowany film poliestrowy, biały atrament.

#### Działanie

NiQuitin Przezroczysty to lek w postaci przezroczystych, kwadratowych plastrów przyklejanych na skórę, ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu.

NiQuitin Przezroczysty przez całą dobę dostarcza organizmowi stałą dawkę nikotyny. W trakcie dziesięcio- lub ośmiotygodniowego leczenia stopniowo zmniejsza się zapotrzebowanie organizmu na nikotyne.

#### Wskazania - Niquitin, plastry przezroczyste, 14 mg, 7 szt.

NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (ból głowy, ból mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, NiQuitin Przezroczysty należy stosować jednocześnie z programem psychologicznym wspierającym rzucenie palenia.

#### Dawkowanie - Niquitin, plastry przezroczyste, 14 mg, 7 szt.

Dorośli: Przed rozpoczęciem kuracji należy zaprzestać palenia tytoniu. Palenie nawet niewielkiej ilości tytoniu podczas próby zerwania z nałogiem może doprowadzić do jego nawrotu. Podczas trwania terapii nie należy palić papierosów ani przyjmować nikotyny w innej

postaci, np. gumy do żucia z nikotyną ponieważ może to spowodować przedawkowanie nikotyny.

Osobom palącym ponad 10 papierosów w ciągu doby dawkę nikotyny zmniejsza się w trzech etapach zgodnie z następującym schematem dawkowania:

\* stopień pierwszy 21 mg przez 6 tygodni

\* stopień drugi 14 mg 2 tygodnie

\* stopień trzeci 7 mg 2 tygodnie

Osobom palącym mniej niż 10 papierosów w ciągu doby dawkę nikotyny zmniejsza się w dwóch etapach zgodnie z następującym schematem dawkowania:

\* stopień drugi 14 mg 6 tygodni

\* stopień trzeci 7 mg 2 tygodnie

Leku nie należy stosować dłużej niż 10 tygodni. Jeżeli kuracja nie przyniosła oczekiwanego efektu (np. pacjent nie przestał palić lub zaczął ponownie), należy skonsultować się z lekarzem w celu uzgodnienia dalszego leczenia.

Dzieci:

Bezpieczeństwa i skuteczności leczenia nie ustalono u palących dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**