

Nitrazepam GSK 5 mg 20 tabletek

Nasza cena: 35,78 zł

Opis słownikowy

Dawka	5MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	GLAXO WELLCOME S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	NITRAZEPAMUM

Opis produktu

Opis

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie ciężkiej bezsenności charakteryzującej się trudnością w zasypianiu i częstymi nocnymi przebudzeniami, wpływających na pogorszenie stopnia jakości życia pacjenta oraz narażających pacjenta na ciężki stres, gdy możliwa jest sedacja w ciągu dnia.

Dawkowanie

Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki. Czas trwania leczenia nie powinien być dłuższy niż 4 tyg. Zazwyczaj stosuje się: dorośli: 5-10 mg przed snem; osoby powyżej 65 rż.: początkowo 2,5 mg przed snem, w razie konieczności dawkę można zwiększyć do 5 mg przed snem. Stosowanie leku u dzieci jest przeciwwskazane. Zaburzona czynność wątroby lub nerek: nie należy przekraczać połowy dawki stosowanej u pacjentów z prawidłową funkcją wątroby lub nerek.

Działanie

Nitrazepam jest pochodną benzodiazepiny o działaniu uspokajającym. Działanie leku występuje ciągu 30-60 minut od przyjęcia umożliwiając zapadnięcie w sen trwający 6-8 h. Wchłanianie. Nitrazepam dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego.

Skład

1 tabletkę zawiera 5 mg nitrazepamu.

Przeciwwskazania

Nitrazepam jest przeciwwskazany w przypadku: nadwrażliwości na benzodiazepiny, nitrazepam lub którąkolwiek substancję pomocniczą; zespołu bezdechu sennego; ostrej niewydolności oddechowej; depresji oddechowej; myasthenia gravis; ciężkiej niewydolności wątroby; pacjentów z fobią lub natręctwami; pacjentów z przewlekłymi psychozami; dzieci.

Działania niepożądane

Przed zażyciem leku należy zapoznać się z możliwymi działaniami niepożądanymi zawartymi w ulotce.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.