

Nitrendypina Egis 10 mg 30 tabletek

Nasza cena: 4,71 zł

Opis słownikowy

Dawka	10MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	EGIS PHARMACEUTICALIS LTD. WĘGRY [HU]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	NITRENDIPINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest wskazany do leczenia nadciśnienia tętniczego samoistnego.

Dawkowanie:

Dawkowanie oraz sposób użycia leku powinny zostać ustalone indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

Istotne jest, aby rozpocząć leczenie od najmniejszej skutecznej dawki nitrendypiny która wynosi od 5 do 10 mg raz na dobę.

Działanie:

- przeciwnadciśnieniowe

Skład:

1 tabletki zawiera 10 mg nitrendypiny.

Przeciwwskazania:

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów:

- z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- we wstrząsie kardiogenym,
- z niedociśnieniem tętniczym,
- ze znacznym zwężeniem lewego ujścia tętniczego,
- po ostrym zawale mięśnia sercowego,
- z niestabilną dusznicą bolesną,
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Działania niepożądane:

U pacjentów mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane. W zależności od stopnia zaawansowania choroby a także od pacjenta reakcje niepożądane mogą objawiać się w różny sposób. Mogą one również w ogóle nie występować.

- reakcja alergiczna,
- reakcje lękowe,
- zaburzenia snu,
- ból głowy,
- napady duszniczy bolesnej,
- rozszerzenie naczyń krwionośnych,
- wzdęcie,
- nagłe zaczerwienienie twarzy,
- świąd,
- pokrzywka,
- wysypka,
- nadwrażliwość na światło,
- złe samopoczucie.

Jeżeli pacjent chce uzyskać więcej informacji na temat działań niepożądanych powinien sięgnąć do ulotki informacyjnej dołączonej do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub też farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.