

Nizoral 2% krem, 30g



Nasza cena: 33,84 zł

Opis słownikowy

Dawka	2 %
Opakowanie	30 g
Postać	KREM
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHN WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	KETOCONAZOLUM

Opis produktu

Opis

Nizoral 2% krem, 30g

Nizoral Krem 20mg/g 30g

Wskazania

Nizoral Krem 20mg/g to lek do miejscowego stosowania w leczeniu grzybicy skóry tułowia, pachwin, rąk i stóp wywołanych następującymi dermatofitami: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*, a także drożdżycy skóry i łupieżu pstrego (*Pityriasis versicolor*). Lek Nizoral krem jest także zalecany w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry, związanego z obecnością drożdżaka *Malassezia ovale* (*Pityrosporum ovale*).

Właściwości

Nizoral to lek w postaci kremu o silnym działaniu przeciwgrzybiczym. Krem jest stosowany w miejscowym leczeniu grzybicy skóry tułowia, rąk, stóp i pachwin, łojotokowego zapalenia skóry oraz łupieżu pstrego. Lek Nizoral w postaci kremu zawiera substancję czynną ketokonazol, o silnym działaniu przeciwgrzybiczym. Ketokonazol działa na dermatofity z rodzaju: *Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum* oraz drożdżaki z rodzaju *Candida* i *Malassezia* (*Pityrosporum*).

Skład

Substancją czynną leku jest ketokonazol. 1 g kremu zawiera 20 mg ketokonazolu. Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, sorbitanu stearynian, polisorbant 60, izopropylu myrystynian, sodu siarczyny bezwodny (E 221), polisorbant 80, woda oczyszczona.

Stosowanie

Lek Nizoral, krem jest przeznaczony do stosowania na skórę u osób dorosłych.

Drożdżycza skóry, grzybica tułowia, pachwin, grzybica rąk i stóp, łupież pstry (Pityriasis versicolor): należy nanosić lek Nizoral, krem na chorobowo zmienione miejsca na skórze oraz skórę bezpośrednio do nich przylegającą raz na dobę.

Średni czas trwania leczenia:

- łupież pstry: 2 do 3 tygodni,
- drożdżycza skóry: 2 do 3 tygodni,
- grzybica pachwin: 2 do 4 tygodni,
- grzybica tułowia: 3 do 4 tygodni,
- grzybica stóp: 4 do 6 tygodni.

Łojotokowe zapalenie skóry: w zakażeniach skóry objawiających się brązowo-czerwonymi plamami lub białymi i żółtymi łuskami (łojotokowe zapalenie skóry) lek Nizoral, krem należy stosować raz lub dwa razy na dobę. Objawy zakażenia ustępują zwykle po 2-4 tygodniach. Zwykle poprawa jest widoczna po 4 tygodniach leczenia. W razie braku poprawy należy skontaktować się z lekarzem.

Lek należy stosować jeszcze przez kilka dni po całkowitym ustąpieniu objawów zakażenia. Nawet po całkowitym wyleczeniu, aby zapobiec nawrotom choroby, pacjent powinien stosować lek Nizoral, krem raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie. W trakcie leczenia, aby zapobiec powtórному zakażeniu, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.