

Nizoral (Imp.row.) Krem 2%



Nasza cena: 25,48 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30g
Producent	Inpharm Sp. Z O. O.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Nizoral krem 2% 30 g

Dawkowanie - Nizoral (Imp.row.) Krem 2%

W grzybicy i drożdżycy skóry oraz łupieżu pstrym krem nanosi się raz dziennie na zmiany skórne. W łojotokowym zapaleniu skóry - w zależności od nasilenia objawów - krem stosuje się raz lub 2 razy dziennie przez 2-4 tygodnie, a następnie prowadzi leczenie podtrzymujące stosując preparat 1-2 razy w tygodniu. Czas trwania leczenia: łupież pstry i drożdżycę 2-3 tyg.; grzybica kończyn 2-4 tyg.; grzybica tułowia 3-4 tyg.; grzybica stóp 4-6 tyg.

Składniki - Nizoral (Imp.row.) Krem 2%

1 g kremu zawiera 20 mg ketokonazolu.

Działania

Pochodna imidazolu, lek przeciwgrzybiczy w postaci preparatu do stosowania miejscowego. Hamuje biosyntezę ergosterolu, niezbędnego do budowy błony komórkowej grzyba, co powoduje zmiany jej przepuszczalności i prowadzi do obumarcia komórki. Działa na dermatofity (rodzaj *Microsporum*, *Trichophyton*, *Epidermophyton*), drożdżaki (*Candida* spp., *Cryptococcus neoformans*, *Pityrosporum versicolor* i *Pityrosporum ovale*) oraz grzyby dimorficzne (rodzaj *Coccidioides*, *Histoplasma*, *Paracoccidioides*). Wchłanianie przez skórę zachodzi w niewielkim stopniu. Lek nie przenika do krwi i nie wywiera działania układowego. Zastosowany w postaci kremu szybko znosi świąd i powoduje gojenie zmian skórnych.

Wskazania - Nizoral (Imp.row.) Krem 2%

Grzybice skóry (tułowia, podudzi, rąk i stóp) wywołane przez dermatofity i drożdżaki, łupież pstry, łojotokowe zapalenie skóry.

Przeciwwskazania - Nizoral (Imp.row.) Krem 2%

Nadwrażliwość na pochodne imidazolu lub inne składniki preparatu (zwłaszcza glikol propylenowy i siarczyn sodu). Może wystąpić podrażnienie i pieczenie skóry, rumień, reakcje nadwrażliwości.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.