

Nizoral szampon przeciwłupieżowy, 60 ml



Nasza cena: 36,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	60 ml
Postać	SZAMPON
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	KETOCONAZOLUM

Opis produktu

Opis

Nizoral szampon przeciwłupieżowy, 60 ml

Nizoral w postaci szamponu leczniczego jest lekiem przeciwgrzybiczym do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancję czynną ketokonazol.

Dawkowanie - Nizoral szampon przeciwłupieżowy, 60 ml

O ile lekarz nie zaleci inaczej, Nizoral szampon leczniczy, zwykle stosuje się jak opisano poniżej:

1. nanieść niewielką ilość szamponu na zakażoną skórę.
2. używając niewielkiej ilości wody rozprowadzić szampon równomiernie na skórze. W przypadku długich włosów wystarczy umyć jedynie skórę głowy.
3. wcierać szampon w skórę, aż do uzyskania piany.
4. pozostawić na skórze przez 3 do 5 minut, a następnie spłukać.
5. na co dzień można używać zwykłego szamponu.

- łupież pstry - stosować raz na dobę przez 5 kolejnych dni.

- łojotokowe zapalenie skóry i łupież skóry głowy - stosować dwa razy w tygodniu przez 2 do 4 tygodni.

Składniki - Nizoral szampon przeciwłupieżowy, 60 ml

Substancja aktywna: ketokonazol, substancje pomocnicze: sól sodowa eteru laurylosulfonowego, sól disodowa eteru monolaurylosulfonobursztynowego, dietyloamid kwasu tłuszczowego oleju kokosowego, laurdimonium zhydrolizowany zwierzęcy kolagen, dioleinian metyloglukozowy makrogolu 120, chlorek sodu, stężony kwas solny, imidurea, zapach (perfumy boquet), wodorotlenek sodu, erytrozyna sodu, woda oczyszczona.

Wskazania - Nizoral szampon przeciwłupieżowy, 60 ml

Preparat stosowany w leczeniu i profilaktyce następujących chorób skóry: łupieżu skóry głowy, łojotokowym zapaleniu skóry, łupieżu pstym.

Przeciwwskazania - Nizoral szampon przeciwłupieżowy, 60 ml

Nadwrażliwość na ketokonazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nizoral.

Przeciwwskazania - Nizoral szampon przeciwłupieżowy, 60 ml

Mogą wystąpić reakcje miejscowe, jak pieczenie, swędzenie, podrażnienie, a także objawy przetłuszczania bądź wysuszenia włosów. W rzadkich przypadkach, głównie u pacjentów z chemicznie zniszczonymi lub z siwymi włosami było obserwowane odbarwienie włosów.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów stosujących lek) występowały reakcje nadwrażliwości, łysienie, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry, suchość skóry, odczyny w miejscu podania.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.