

Noliprel Forte 30 tabletek

Nasza cena: 24,29 zł

Opis słownikowy

Dawka	5MG+1,25MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	ANPHARM S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	PERINDOPRILUM, INDAPAMIDUM

Opis produktu

Opis

Noliprel Forte 30 tabletek

Wskazania:

Zaleca się stosowanie produktu w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego u dorosłych.

Stosowanie produktu jest przede wszystkim wskazane u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania peryndoprylu w monoterapii.

Dawkowanie:

Zaleca się stosowanie 1 tabletki powlekanej produktu raz na dobę, najlepsza pora przyjmowania leku to rano, tuż przed posiłkiem.

Jeżeli istnieje taka możliwość, zaleca się oddzielne dostosowanie dawki poszczególnych składników preparatu. Produkt należy stosować, gdy ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane po zastosowaniu produktu (jeżeli dotyczy). Jeżeli jest to klinicznie właściwe, można rozważyć bezpośrednią zmianę z monoterapii na leczenie produktem.

U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się rozpocząć leczenie w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego oraz czynności nerek.

Działanie:

Lek jest produktem złożonym, zawierającym peryndopryl z arginina - inhibitor ACE i indapamid - chlorosulfamoidowy lek moczopędny. Jego właściwości farmakologiczne wywodzą się z odrębnych właściwości obu składników oraz właściwości wynikających z addytywnego, synergicznego działania w skojarzeniu.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera w swoim składzie 3,395 mg peryndoprylu, co odpowiada 5 mg peryndoprylu z arginina oraz 1,25 mg indapamidu.

Przeciwwskazania:

Związane z peryndoprylem:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek inhibitor ACE,
- obrzęk naczynioruchowy (obrzęk Quinckego) związany z uprzednim leczeniem inhibitorami ACE,
- wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy,
- II i III trymestr ciąży,
- jednoczesne stosowanie preparatu z produktami zawierającymi aliskiren u pacjentów - z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek,

Związane z indapamidem:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub inne sulfonamidy,
- ciężkie zaburzenie czynności nerek ,
- encefalopatia wątrobowa,
- ciężkie zaburzenie czynności wątroby,
- hipokaliemia,
- ogólną zasadą jest niekojarzenie tego produktu z lekami nie-przeciwwyrytmicznymi powodującymi torsade de pointes, laktacja.

Związane z produktem:

- nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- u pacjentów poddawanych dializoterapii,
- u pacjentów z nieleczoną,
- niewyrównaną niewydolnością serca.
- ciężkiego zaburzenia czynności nerek,
- ciężkiego zaburzenia czynności wątroby.

Działania niepożądane:

Najczęstsze działania niepożądane jakie mogą występować po przyjęciu leku to:

- zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego,
- ból głowy,

- parestezje,
- zaburzenie smaku,
- zaburzenia widzenia,
- zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,
- szum uszny,
- niedociśnienie tętnicze,
- kaszel,
- duszność,
- ból brzucha,
- zaparcie,
- niestrawność,
- biegunka,
- nudności,
- wymioty,
- świąd,
- wysypka,
- kurcze mięśni i astenia.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.