

Nolpaza 20 mg, 56 tabletek

Nasza cena: 11,15 zł

Opis słownikowy

Dawka	20MG
Opakowanie	*56
Postać	TABL.DOJELIT.
Producent	KRKA PHARM.D.D. NOVO MESTO SŁOWENIA [SI]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	PANTOPRAZOLUM

Opis produktu

Opis

Nolpaza 20 mg, 56 tabletek

Wskazania:

Zaleca się stosowanie leku przez pacjentów u których występują następujące dolegliwości:

- objawowa choroba refluksowa przełyku,
- długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku,
- w celu zapobiegania owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy.

Dawkowanie:

Lek należy stosować pod kontrolą lekarza, zgodnie z jego zaleceniami. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.

Dorośli i młodzież 12 lat i powyżej:

Objawowa postać choroby refluksowej przełyku:

- zalecaną dawką wynosi 1 tabletkę dojelitową produktu leczniczego na dobę.

Zazwyczaj ustąpienie objawów następuje w ciągu 2-4 tygodni

Długotrwałe leczenie oraz zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku:

W celu długotrwałego leczenia, zalecana jest dawka podtrzymująca wynosząca 1 tabletkę dojelitową produktu leczniczego na dobę. W przypadku wystąpienia nawrotu choroby, dawkę zwiększa się do 40 mg pantoprazolu/dobę.

Działanie:

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez swoiste blokowanie pompy protonowej komórek okładzinowych. W kwaśnym środowisku, w świetle kanalików komórek okładzinowych, pantoprazol jest przekształcany do postaci czynnej, gdzie hamuje enzym H^+ , K^+ -ATPazę, tj. ostatni etap produkcji kwasu solnego w żołądku. Hamowanie to jest zależne od dawki i wpływa zarówno na podstawowe, jak i stymulowane wydzielanie kwasu. U większości pacjentów, ustąpienie objawów następuje w ciągu 2 tyg. Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej i inhibitorów receptora H_2 , leczenie pantoprazolem zmniejsza kwaśność soku żołądkowego i tym samym zwiększa ilość gastryny proporcjonalnie do zmniejszenia kwaśności soku żołądkowego. Zwiększenie wydzielania gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z enzymem dystalnie w stosunku do poziomu receptora komórki, substancja ta może wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od stymulacji przez inne substancje (acetylocholinę, histaminę, gastrynę). Działanie jest takie samo niezależnie czy produkt jest podawany doustnie czy też dożylnie.

Skład:

1 tabletkę dojelitową zawiera 20 mg (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjentów występuje nadwrażliwość na substancję czynną, sorbitol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane.

Najczęstsze jakie występują to:

- nadwrażliwość,
- zmiana masy ciała,
- dezorientacja,
- omamy,
- splątanie,
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- zaburzenia smaku,
- parestezje,
- zaburzenia widzenia/niewyraźne widzenie,
- biegunka,
- nudności/wymioty,

- uczucie pełności w jamie brzusznej,
- wzdęcia,
- zaparcia,
- suchość w jamie ustnej,
- ból i dyskomfort w jamie brzusznej.

W celu poznania innych działań niepożądanych występujących podczas stosowania leku należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem lub też farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.